

TOCILIZUMAB (ROACTEMRA®)

Servei de Farmàcia

Roactemra® conté el principi actiu Tocilizumab.

Tocilizumab és un agent biològic que actua reduint el dolor i la inflamació, associat a artritis reumatoide.

Com s'ha de prendre?


Roactemra® s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, contusionada o endurida.

La dosi inicial recomanada per pacients adults amb artritis reumatoide és de 162 mg subcutània cada setmana.

Triï un dia i administri sempre Roactemra® el mateix dia de la setmana i a la mateixa hora.

Els pacients que canviïn de la presentació intravenosa a la subcutània, hauran d'administrar-se la primera dosi subcutània en lloc de la següent dosi endovenosa programada i posteriorment 1 dosi setmanalment.

Roactemra® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar. No agitar. Un cop fora de la nevera Roactemra® s'ha d'administrar en les següents 8 h i no es pot emmagatzemar per sobre de 30°C.



Què fer si s'oblida una dosi?

Administri-la l'abans possible i segueixi administrant les següents dosis cada setmana.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins tres mesos després de finalitzar el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge. Abans d'iniciar la lactància materna consulti al seu metge.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Roactemra®.

Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Si té una infecció activa com la grip, angines o febre no ha de començar el tractament amb Roactemra®.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Roactemra® 162 mg ploma precarregada

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Roactemra®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Roactemra® trobem:

- Risc augmentat de patir infeccions, com la tuberculosi que es pot manifestar amb tos persistent, pèrdua de pes, apatia o febrícula, o de qualsevol altre tipus d'infecció que pot cursar amb febre, malestar general, dolor, molèsties en orinar.
- Reacció d'hipersensibilitat que es manifesta en forma d'erupció cutània, febre, dificultat respiratòria o picor.
- Reacció en el lloc d'injecció: eritema, pruíja, dolor i hematoma.
- Alteracions hematològiques: descens dels neutròfils, elevació de les transaminases i dels paràmetres lipídics.
- Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C), no congelar.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Protegir de la llum.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

<http://www.lire.es/index.php/area-descargas>

<http://www.forumclinic.org/es/artrosis-y-artritis/informaci%C3%B3n/informaci%C3%B3n-sobre-artrosis-y-artritis>

