

VALGANCICLOVIR EFG

Servei de Farmàcia

Valganciclovir pertany a un grup de medicaments que actuen directament per a prevenir el creixement dels virus. En l'organisme, el principi actiu dels comprimits, valganciclovir, es transforma en ganciclovir.

Principalment s'utilitza per al tractament de la retinitis (infecció de la retina) produïda per citomegalovirus en pacients adults amb SIDA.

La infecció en la retina de l'ull per citomegalovirus pot causar problemes en la visió o inclús ceguesa.

Com s'ha de prendre?

Els comprimits de Valganciclovir s'han de manipular amb molt de compte i no es poden partir o triturar. S'han d'empassar sencers i amb aliments sempre que sigui possible.

Si per casualitat toca un comprimit trencat, renti amb molt de compte les seves mans amb aigua i sabó, si la pols del comprimit ha entrat en contacte amb els seus ulls, renti'ls amb aigua estèril o abundant aigua si no té aigua estèril.

La dosi habitual és de dos comprimits, un cop al dia en cas de prevenció o dos comprimits dos cops al dia per al tractament de la retinitis per citomegalovirus.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui la dosi oblidada tan aviat com ho recordi i prengui la següent dosi a la seva hora habitual.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

No administrar si té al·lèrgia a valganciclovir o ganciclovir.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar mètodes anticonceptius efectius durant el tractament amb Valganciclovir i, almenys, durant 30 dies després d'haver-lo finalitzat.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Valganciclovir. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Valganciclovir trobem:

- Major risc d'infeccions com candidiasis o infeccions del tracte respiratori
- Alteracions de la sang com anèmia
- Disminució de l'apetit
- Mal de cap
- Nàusees, vòmits, diarrea, dolor abdominal
- Dermatitis
- Tos
- Fatiga
- Febre

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

