

VELPATASVIR/ SOFOSBUVIR (EPCLUSA®)

Servei de Farmàcia

Epclusa® conté dos fàrmacs: sofosbuvir i velpatasvir. Està indicat per l'hepatitis C, és una inflamació del fetge produïda per la infecció d'un virus. Si no es tracta el fetge es va deteriorant i hi ha risc de desenvolupar una cirrosi hepàtica, descompensació hepàtica i risc de càncer de fetge.

Com l'ha de prendre?

El Velpatasvir + Sofosbuvir (Epclusa®) és un comprimit diari que s'administra amb aliments o sense. Es recomana prendre'l sencer, ja que presenta sabor amarg.

Es recomana que begui abundants líquids durant el tractament.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi d'Epclusa®?

L'ha de prendre tan aviat com sigui possible.

Si s'adona dins de les **18 hores** des del moment en què pren Epclusa® habitualment, se l'ha de tornar a prendre el més aviat possible. I la dosi següent la prendrà a l'hora habitual.

Si s'adona passades les 18 hores d'haver pres Epclusa®, esperar i prendre la següent dosi a l'hora habitual.

No dobli mai la dosi.

Precaucions

Si té hipersensibilitat a Sofosbuvir, Velpatasvir o lactosa.

En cas d'insuficiència renal greu.

Si el tractament es combina amb Ribavirina es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament, tant en les pacients tractades, com en les parelles de sexe femení dels pacients masculins.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

S'ha notificat en algun pacient episodis de cansament durant el tractament, cal tenir-ho en compte si el pacient ha de conduir o manipular maquinària.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte del seu tractament. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Es recomana no prendre concomitant amb inhibidors de la bomba de protons. Si és imprescindible, cal espaiar un mínim de 4 h (primer Epclusa®, 4 h més tard el protector gàstric).

Està contraindicada l'administració concomitant amb rosuvastatina, inhibidors de la HMG-Co A reductasa, herba de Sant Joan, rifampicina, carbamazepina, fenitoïna, rifabutina, rifapentina entre d'altres.

Efectes adversos

Tots els medicaments poden produir efectes secundaris, el que és important, és que els coneguem i actuem de forma ràpida i adequada en cada moment.

Pot provocar:

- Cansament
- Mal de cap
- Nàusees

Si es combina amb Ribavirina pot produir anèmia.

Davant qualsevol efecte advers no descrit en aquest document, que cregui que pot estar relacionat amb la medicació, cal comunicar-ho al seu metge.

Es recomana NO prendre alcohol, per no augmentar la lesió del fetge.

Conservació

Epclusa[®] es conserva a temperatura ambient i protegit de la llum.

Recordi:

Prengui el medicament com li ha indicat el seu metge.

El tractament és personal i no l'ha d'utilitzar una altra persona.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent altres medicaments.

Mantingui el medicament fora l'abast dels nens.

No utilitzi el medicament un cop superada la data de caducitat (darrer dia del mes indicat a l'envàs).

Important:

Abans de començar el tractament és imprescindible que estigui convençut de què és necessari, que entengui per què i com ho ha de fer i que se senti capaç de portar-lo a terme correctament.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

<http://www.cdc.gov/spanish/az/h.html>



Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS		Descripción			
Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripciones	Presencia de dibujo
	ROSA	NO	20,00mm	GS1 7916	NO