

VELPATASVIR / SOFOSBUVIR / VOXILAPREVIR (VOSEVI®)

Servei de Farmàcia

Vosevi® conté tres fàrmacs: Sofosbuvir, Velpatasvir i Voxilaprevir. Està indicat en l'Hepatitis C. És una inflamació del fetge produïda per la infecció d'un virus, si no es tracta, va deteriorant el fetge de manera progressiva i hi ha risc de desenvolupar una cirrosi hepàtica, descompensació hepàtica i risc de càncer de fetge.

Com l'ha de prendre?

El Velpatasvir + Sofosbuvir + Voxilaprevir (Vosevi®) és un comprimit diari que s'administra amb aliments. Es recomana prendre sencer, pel seu sabor amarg.

Es recomana que begui abundants líquids durant el tractament.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi de Vosevi®?

Si se n'adona compte en **el termini de 18 hores** des del moment en què hauria d'haver pres Vosevi® habitualment, s'ha de prendre el comprimit el més aviat possible i la dosi següent l'haurà de prendre a l'hora habitual.

Si se n'adona compte **després de 18 hores o més** des del moment en què hauria d'haver pres Vosevi® habitualment, esperar i prendre la següent dosi a l'hora habitual.

No dobli mai la dosi.

Precaucions

Si té hipersensibilitat a Sofosbuvir, Velpatasvir, Voxilaprevir o lactosa.

En cas d'insuficiència renal greu.

Tractament concomitant amb amiodarona.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte del seu tractament. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Està contraindicada l'administració concomitant amb rosuvastatina inhibidors de la HMG-Co A reductasa dabigatran, herba de Sant Joan, rifampicina, carbamazepina, fenitoïna, rifabutina, rifapentina entre d'altres.

Efectes adversos

Pot provocar:

- Mal de cap
- Nàusees
- Diarrea

Davant qualsevol efecte advers no descrit en aquest document, que cregui que pot estar relacionat amb la medicació, cal comunicar-ho al seu metge. Es recomana No prendre alcohol per no augmentar la lesió del fetge.

Conservació

Vosevi® es conserva a temperatura ambient i protegit de la llum.

Recordi:

Prengui el medicament com li ha indicat el seu metge.

El tractament és personal i no l'ha d'utilitzar una altra persona.

Informi al seu metge o farmacèutic si està prenent altres medicaments.

Mantingui el medicament fora l'abast dels nens.

No utilitzi el medicament un cop superada la data de caducitat (darrer dia del mes indicat a l'envàs).

Important:

Abans de començar el tractament és imprescindible que estigui convençut de què és necessari, que entengui per què i com ho ha de fer i que se senti capaç de portar-lo a terme correctament.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

<http://www.cdc.gov/spanish/az/h.html>



Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS
Descripción

Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripciones	Presencia de dibujo
	BEIGE	NO	20,00mm	GSI 3	NO