

ZIDOVUDINA (RETROVIR®)

Servei de Farmàcia

Conté el principi actiu Zidovudina.

Zidovudina és un inhibidor anàleg de nucleòsid de la transcriptasa inversa, és a dir, bloqueja l'activitat d'un enzim anomenat transcriptasa inversa produïda pel VIH que li permet infectar les cèl·lules de l'organisme i produir més virus.

En administrar Retrovir® en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Retrovir® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí que pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Els comprimits s'han de prendre amb molta d'aigua, 30 minuts abans o 1 hora després dels àpats. Es poden partir.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Presentacions comercials

Presentacions al nostre centre:

- Retrovir® 250 mg càpsules
- Retrovir® 300 mg càpsules
- Retrovir® 50 mg/ 5 ml 200 ml solució
- Retrovir® 10 mg/ml vials 20 ml

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Retrovir® com estavudina.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Retrovir® trobem:

- Mal d'estómac, diarrea, estrenyiment, mal de cap, mareig i dificultat per dormir.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

