

DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRINA (JULUCA®)

Servei de Farmàcia

És la combinació de dos fàrmacs: Dolutegravir (50 mg) i Rilpivirina (25 mg).

Rilpivirina és un nou inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH-1 no anàleg dels nucleòtids amb estructura diarilpirimidínica. Dolutegravir és un inhibidor de la integrasa.

Juluca® està indicat en el tractament del VIH. Manté la quantitat de VIH a la sang a nivells baixos. No cura la infecció pel VIH, però sí que pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició d'infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Juluca® s'administra per via oral un comprimit al dia amb un àpat, s'ha d'empassar sencer amb un got d'aigua.

Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible amb un àpat, excepte si la següent dosi està prevista dins de les següents 12 hores, aleshores continuï amb la pauta posològica normal.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Si vomita dins de les 4 hores següents a l'administració de Juluca®, s'ho ha de tornar a prendre amb un àpat. Si vomita després de 4 hores de prendre Juluca®, no el torni a prendre fins a la següent dosi de forma regular.

En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament.

Juluca® pot provocar reaccions d'hipersensibilitat. S'ha d'interrompre l'administració de Juluca® d'immediat si es desenvolupen aquestes reaccions i consultar al metge.

No es recomana utilitzar Juluca® durant l'embaràs, si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

S'han notificat en algun pacient episodis de cansament, mareig i somnolència durant el tractament amb Juluca® cal tenir-ho en compte si el pacient ha de conduir o manipular maquinària.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Juluca®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

No es recomana el tractament amb Juluca® i antiepilèptics, inhibidors de la bomba de protons, adefovir, didanosina i herba de Sant Joan.

Efectes secundaris

Els més freqüents són: nàusees, mal de cap, mareig, insomni i augment del colesterol, entre altres.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Presentacions comercials

Juluca® 50/25 mg comprimit recobert amb pel·lícula. Cada envàs consisteix d'un flascó que conté 30 comprimits i un dessecant.

Conté lactosa com excipient.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat. No tregui el dessecant.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

https://cima.aemps.es/cima/dohtml/ft/1181282001/FT_1181282001.html

<https://es.juluca.com/>

