

ADALIMUMAB 40 mg (IDACIO®)

Servei de Farmàcia

Adalimumab és un agent biològic que actua reduint el dolor i la inflamació, associat a certes malalties autoimmunes com artritis reumatoide, artritis idiopàtica, artritis associada a entesitis, espondilitis anquilosant, espondiloartritis axial, artritis psoriàsica, psoriasis, malaltia de Crohn, hidradenitis, colitis ulcerosa i uveïtis no infecciosa.

Com s'ha d'administrar?


Adalimumab s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

La dosi inicial pot variar depenent de la patologia, sent la dosi de manteniment habitual de 40 mg (una ploma o xeringa) cada dues setmanes. Triï un dia de la setmana, i administri adalimumab el mateix dia a la mateixa hora, una setmana sí i una setmana no. No afecta la conducció, el son ni l'alimentació.

Adalimumab es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar.

On es pot administrar? Abdomen, cuixes, glutis, deltoides (imatge).

En cas de tenir febre alta (>38°C), retardar l'administració. En cas de vacunar-se, retardar també l'administració almenys 5 dies.



Què fer si s'oblida una dosi?

Administrar-la el més aviat possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

La dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins 5 mesos després de finalitzar-lo.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament i fins 5 mesos després de finalitzar.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Adalimumab. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Adalimumab 40 mg ploma precarregada

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Adalimumab. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a adalimumab trobem:

- Risc augmentat de patir infeccions (que es poden manifestar amb: febre, ferides, malestar general, problemes dentals, tos, molèsties en orinar); dolor muscular, pruïja en el lloc d'injecció; reacció al·lèrgica (erupció cutània, urticària, dificultat per respirar, inflamació de la cara); debilitat en braços o cames; visió doble; formigueig; dolor en el pit; peus i turmells inflats; mal de cap; dolor abdominal; nàusees i vòmits, èczema cutani

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi a la nevera (entre 2 i 8°C). NO CONGELAR.

Si per accident la medicació queda fora de la nevera, la medicació és estable 28 dies a temperatura ambient (tirar passats els 28 dies).

Si es congela no la llençi i consulti al servei de farmàcia de l'hospital.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

