

ABROCITINIB comprimits (Cibinqo®)

Servei de Farmàcia

Cibinqo® conté el principi actiu Abrocitinib.

Abrocitinib pertany a un grup de medicaments anomenats inhibidors de la Janus Quinasa (JAK), actua reduint l'activitat d'aquest enzim que està involucrat en el procés inflamatori.

Està indicat pel tractament de la dermatitis atòpica en pacients adults.

Com s'ha de prendre?

Cibinqo® s'administra per via oral. S'ha d'empassar el comprimit amb una mica d'aigua i es pot prendre amb aliments o sense. Si presenta nàusees, la ingesta amb aliments pot millorar les nàusees.

La dosi recomanada és de 200 mg un cop al dia. El seu metge pot donar-li una dosi més baixa de 100 mg un cop al dia, especialment si vostè té més de 65 anys.

Durant el tractament, la dosi es pot reduir o augmentar segons la tolerabilitat i l'eficàcia.

Per prendre Cibinqo®, pot resultar més fàcil prendre'l barrejat amb aliments. Es suggereix que el prengui sempre a la mateixa hora tots els dies.

Què fer si s'oblida una dosi?

Administri Cibinqo® el més aviat possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament i almenys un mes després de finalitzar-lo.

No es recomana l'ús de vacunes vives atenuades durant el tractament amb Cibinqo® o just abans d'iniciar-lo. Cal tenir totes les vacunes actualitzades abans de començar a prendre'l, incloses les vacunes enfront del virus de l'herpes zòster.

Pacients amb intolerància hereditària a galactosa, deficiència total de lactasa o problemes d'absorció de glucosa o galactosa no poden prendre aquest fàrmac.

Contraindicacions

- Al·lèrgia (hipersensibilitat) al principi actiu o a algun dels excipients.
- Si pateix tuberculosi o infeccions greus actives.
- Insuficiència hepàtica greu.
- Embaràs i lactància.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Cibinqo® com probenecid (per a la gota), rifampicina, fluvoxamina i medicaments que augmenten el pH gàstric, com la famotidina o els inhibidors de la bomba de protons.

Cibinqo® també pot interferir en l'acció d'altres medicaments, com el dabigatran, digoxina, clopidogrel, citalopram, clobazam, escitalopram o selumetinib.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Cibinqo® trobem:

- Risc augmentat de patir infeccions, com herpes zòster que es pot manifestar en forma d'erupció cutània dolorosa amb butllofes i febre, herpes simple o pneumònia.
- Sensació de malestar a l'estómac, nàusees i vòmits.
- Nivells elevats de colesterol observats en anàlisis de sang.
- Nivells baixos de plaquetes (cèl·lules que intervenen en la coagulació de la sang), observat en anàlisis de sang.
- Trastorns de la coagulació.
- Nivells elevats de creatinfosfoquinasa, observat en anàlisis de sang.
- Acne.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

La data de caducitat és l'últim dia del mes que s'indica.



Si vol saber més pot consultar...

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1211593009/FT_1211593009.html