

ADALIMUMAB 80 mg (YUFLYMA[®])

Servei de Farmàcia

Adalimumab és un agent biològic que actua reduint el dolor i la inflamació associats a certes malalties autoimmunes com artritis reumatoide, espondilitis anquilosant, artritis psoriàsica, uveïtis, psoriasis o malaltia de Crohn.

Com s'ha d'administrar?


Adalimumab s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, descamada, tingui un blau o estigui dura. Evitar també zones amb cicatrius.

La dosi inicial pot variar depenent de la patologia, sent la dosi de manteniment habitual de 80 o 40 mg (una ploma) cada dues setmanes.

Endarrerir l'administració en cas de febre i vacuna (no vacunar la mateixa setmana que s'administra el biològic).

Adalimumab es conserva al frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30-60 minuts abans d'administrar-lo.

On es pot administrar? En les zones en gris al dibuix.



Què fer si s'oblida una dosi?

Administrar-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

La dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins 5 mesos després de finalitzar-lo.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament i fins 5 mesos després de finalitzat.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Adalimumab. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Yuflyma 80 mg Ploma precarregada.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Adalimumab. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a adalimumab trobem:

- Risc augmentat de patir infeccions (que es poden manifestar amb febre, ferides, malestar general, problemes dentals, tos, molèsties en orinar); inflamació, dolor, envermelliment, pruija en el lloc d'injecció; reacció al·lèrgica (erupció cutània, dificultat per respirar, inflamació de la cara, mans o peus); debilitat en braços o cames; visió doble; formigueig; dolor en el pit; peus i turmells inflats; mal de cap; nàusees i diarrea; Psoriasi paradoxal.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi a la nevera (entre 2 i 8°C). No s'ha de congelar.

Ha de mantenir el medicament en el seu envàs original fins al moment de l'administració, ja que s'ha de protegir de la llum.

Si per accident la medicació queda fora de la nevera, la medicació és estable 31 dies a temperatura igual o inferior a 25°C (llençar passats els 31 dies). Si ha de viatjar, ha de transportar el seu medicament en una nevera refrigerada portàtil i guardar-ho el més aviat possible a la nevera.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

