

BELIMUMAB (BENLYSTA®)

Servei de Farmàcia

Benlysta® conté el principi actiu belimumab.

Belimumab és un agent biològic que actua reduint el número de cèl·lules B bloquejant l'acció de la proteïna BLyS, proteïna que ajuda a perllongar la supervivència de les cèl·lules B i que es troba en nivells elevats a les persones amb lupus.


Benlysta® està indicat en pacients adults amb lupus eritematós sistèmic (LES) amb malaltia activa tot i el tractament estàndard. També està indicat en pacients adults amb nefritis lúpica.

Com s'ha d'administrar?

Benlysta® s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, contusionada o endurida.

La dosi inicial recomanada per pacients adults amb LES és de 200 mg subcutània cada setmana.

Triï un dia i administri sempre Benlysta® el mateix dia de la setmana i a la mateixa hora.



Els pacients que canviïn de la presentació intravenosa a la subcutània, hauran d'administrar-se la primera dosi subcutània entre 1 i 4 setmanes després de l'última administració intravenosa i posteriorment 1 dosi setmanalment, en el cas de LES i entre 1 i 2 setmanes, en el cas de nefritis lúpica.

Benlysta® es conserva al frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar-lo. No agitar. Un cop fora de la nevera Benlysta® s'ha d'administrar en les següents 12 h i no es pot emmagatzemar per sobre de 25°C.

Què fer si s'oblida una dosi?

Administri-la l'abans possible i continuï administrant les següents dosis cada setmana.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins quatre mesos després de finalitzar el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge. Abans d'iniciar la lactància materna, consulti al seu metge.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Benlysta®.

Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Si té una infecció activa com la grip, angines o febre no ha de començar el tractament amb Benlysta®.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Benlysta® 200 mg ploma precarregada

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Benlysta®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Benlysta® trobem:

- Risc augmentat de patir infeccions, com la tuberculosi que es pot manifestar amb tos persistent, pèrdua de pes, apatia o febrícula, o de qualsevol altre tipus d'infecció que pot cursar amb febre, malestar general, dolor, molèsties en orinar.
- Reacció d'hipersensibilitat que es manifesta en forma d'erupció cutània, febre, dificultat respiratòria o picor.
- Reacció en el lloc d'injecció: eritema, pruija, dolor i hematoma.
- Alteracions hematològiques: descens dels neutròfils.
- Trastorns del sistema nerviós: cefalea, migranya.
- Trastorns gastrointestinals: diarrea, nàusees.
- Trastorns múscul-esquelètics: dolor a les extremitats.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi a la nevera (entre 2 i 8°C). No congelar. Mantenir fora de l'abast dels nens. Protegir de la llum.

Té estabilitat un màxim de 12 h a temperatura màxima 25°C. Protegir de la llum.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

<http://www.lire.es/index.php/area-descargas>

<http://www.forumclinic.org/es/artrosis-y-artritis/informaci%C3%B3n/informaci%C3%B3n-sobre-artrosis-y-artritis>

