

BIMEKIZUMAB (BIMZELX®)


Servei de Farmàcia

Bimzelx® conté el principi actiu Bimekizumab. És un inhibidor de la interleucina (IL17), de manera que actua reduint la seva activitat. Aquestes interleucines estan implicades en la producció de la inflamació.

Està indicat per al tractament de la psoriasi en plaques de moderada a greu, artritis psoriàsica i espondiloartritis axial en adults, malalties inflamatòries on aquestes interleucines es troben en nivells elevats.

Com s'ha de prendre?

Bimzelx® s'administra per via subcutània (sota la pell). És necessari anar canviant la zona d'administració, evitant l'aplicació de les injeccions en plaques psoriàsiques o zones de la pell que manifestin sensibilitat, hematomes o eritemes.



Bimzelx® s'administra:

- **Psoriasi en plaques:** una dosi de 320 mg en la setmana 0, 4, 8, 12 i 16. A continuació 320 mg (cada 8 setmanes).
- **Artritis psoriàsica:** una dosi de 160 mg (1 injecció subcutània) cada 4 setmanes.
- **Espondiloartritis axial:** una dosi de 160 mg (1 injecció subcutània) cada 4 setmanes.

Bimzelx® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar.

En cas de tenir febre alta (>38°C), endarrerir l'administració. En cas de vacunar-se, endarrerir també l'administració almenys 5 dies.

Què fer si s'oblida una dosi?

Consulti al seu metge o farmacèutic. No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins 17 setmanes després de finalitzar el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge, ja que és preferible evitar el seu ús durant l'embaràs.

Algunes **vacunes** estan contraindicades durant el tractament amb Bimzelx®. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Fer servir amb precaució en pacients amb **MII** (Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa), ja que no es recomana el seu ús.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Bimzelx® com la warfarina.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Pot provocar **reaccions al·lèrgiques greus**. Consulti amb el seu metge o busqui assistència mèdica immediatament si observa:

- Sensació de cansament, dificultat per respirar o empassar.
- Pressió arterial baixa, que pot causar mareigs o atordiment.
- Inflor de la cara, llavis, llengua o gola.
- Calor, envermelliment i picor intensa a la pell, erupció vermella o amb ampolles.
- Febre, símptomes pseudogripals, sudoració nocturna.

Entre els **efectes adversos** més freqüents associats a Bimzelx® trobem:

- Infeccions de les vies respiratòries altes (mal de coll i congestió nasal).
- Candidiasis oral i orofaríngia, infeccions d'herpes simple, gastroenteritis.
- Fol·liculitis, acne.
- Mal de cap i fatiga.
- Erupció, dermatitis i èczema.
- Reacció en el lloc d'injecció.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C). No congelar.

Conservar a l'envàs original, protegit de la llum.

Bimzelx® es pot conservar a temperatura ambient, fins a 25°C durant un període màxim de 25 dies protegit de la llum (tirar passats els 25 dies).

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs. La data de caducitat és l'últim dia del mes que s'indica.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

