

BUDESONIDA VISCOSA (fórmula amb Vitajoule®)

Servei de Farmàcia

La budesonida viscosa és una fórmula magistral en format gel indicada per l'esofagitis eosinofílica.

Com s'ha de preparar?

- Per obtenir 1 mg del gel viscós:



Mesurar una cullerada (5 g aprox.) de l'espessant maltodextrina (Vitajoule®) amb la cullereta que ve en el mateix envàs.



En la mateixa cullereta, afegir l'ampolleta de budesonida 2 ml (0,5 mg/ml).



Amb l'ajuda d'una cullereta petita, barrejar suaument fins que s'obtingui un gel viscós homogeni.

Com s'ha d'administrar?

Cal administrar el gel per via oral, després de l'esmorzar i abans d'anar al llit. No ingerir cap aliment sòlid ni líquid en els 30 minuts després de l'administració.

Què fer si s'oblida una dosi?

Administrar-la el més aviat possible, si han passat menys de 4 hores de l'hora programada. Si no, esperar a la següent administració. No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

No prendre en cas d'al·lèrgia a budesonida.

Notificar qualsevol sospita d'infecció respiratòria (tuberculosi, infecció fúngica o vírica).

Conservació

Preparació instantània. Conservar les ampolles de budesonida i el pot de Vitajoule a temperatura ambient.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.