

COLISTIMETAT DE SODI Accord® 1 MUI vial

Servei de Farmàcia

Colistimetat de sodi Accord® conté el colistimetat de sodi com a principi actiu. S'administra de forma inhalatòria per tractar infeccions respiratòries cròniques en pacients amb fibrosi quística (tan adults com nens).

S'utilitza quan aquestes infeccions són causades per un bacteri específic anomenat *Pseudomonas aeruginosa*. Aquest és un bacteri comú que infecta els pulmons de quasi tots els pacients amb fibrosi quística. Colistimetat és aspirat cap a l'interior dels pulmons (inhalat), de manera que la major part de l'antibiòtic pot actuar directament contra el bacteri que causa la infecció.

La dosi habitual en adults és d'1-2 milions d'unitats (MUI) dues o tres vegades al dia (màxim recomanat són 6 MUI al dia).

Com s'ha de preparar?

La seva administració és per nebulització mitjançant un aparell nebulitzador adequat: es pot utilitzar amb qualsevol nebulitzador convencional adequat per a l'administració de solucions d'antibiòtics.

Cal reconstituir cada vial de Colistimetat de sodi Accord® 1 MUI amb 2-4 ml d'aigua per injecció. El volum de reconstitució estarà en funció de les instruccions d'ús de l'aparell d'administració del nebulitzador, i normalment no excedeix els 4 ml.

En el cas que la dosi prescrita sigui 1 MUI (1 vial) a cada administració, el vial es reconstituirà amb 4 ml.

En el cas que la dosi prescrita sigui 2 MUI (2 vials) a cada administració, el vial es reconstituirà amb 2 ml.

La solució sobrant no utilitzada que queda al nebulitzador haurà de rebutjar-se després del tractament.

Si està rebent diferents tractaments per via inhalada, es recomana utilitzar-los en **l'ordre** següent: 1r fisioteràpia respiratòria, 2n broncodilatador (per exemple, Salbutamol) i 3r colistimetat.


- 1) Localitzi la vora del tap vermell de plàstic a prop de la fletxa amb la marca "FLIP UP". Després, aguantant el vial amb una mà i el tap de plàstic amb l'altra, giri el tap de plàstic en sentit contrari a les agulles del rellotge.




- 2) Agafi el tap de plàstic tal com es mostra en la figura 2 i estiri'l lentament.



- 3) Giri el vial perquè el tap de plàstic quedi orientat cap a vostè. Subjectant el tap pel centre, tibi d'ell avall i giri'l lleugerament o bé cap a la dreta o bé cap a l'esquerra perquè el segell metàl·lic es trenqui només per un costat.




- 4) Una vegada trencat, agafi el vial fermament i tregui el segell metàl·lic per deixar al descobert tot el tap de goma.



- 5) Tregui el tap de goma del vial de Colistimetat de sodi Accord® subjectant només la vora exterior del tap i posant-lo cap per a vall sobre una superfície neta. Afegeixi a poc a poc aigua estèril.


- 6) Torni a posar el tap de goma i giri el vial cap per a vall, amb compte dos cops.



- 7) Faci rodar el vial amb compte entre les mans per dissoldre tota la pols de Colistimetat de sodi Accord® visible en la base i al costat del vial. No agiti el vial molt fort, ja que això podria fer que la solució formés escuma.



- 8) Quan la pols ja s'hagi dissolt, deixi reposar el vial entre 5-10 minuts perquè desaparegui la mica d'escuma formada i que qualsevol part de pols es dissolgui. Posi la solució en el nebulitzador i inhali immediatament.



Què fer si s'oblida una dosi?

Apliqui la dosi tan aviat com ho recordi, a no ser que estigui més pròxima l'hora de la següent dosi. No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Interaccions amb altres medicaments

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Colistimetat de sodi pot afectar els ronyons, sobretot si la dosi és elevada o si està prenent altres medicaments que puguin afectar els ronyons.

Colistimetat de sodi interacciona amb els relaxants musculars no despolaritzants (utilitzats en anestèsia general com per exemple vecuroni, rocuroni). Es podria prolongar l'efecte dels relaxants, informi al seu anestesista que està utilitzant colistimetat.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Colistimetat de sodi Accord® trobem:

- Reaccions al·lèrgiques que es manifesten en erupcions cutànies.
- Tos
- Opressió en el pit
- Broncoconstricció
- Broncoespasme
- Irritació al coll
- Irritació bucal
- Mal de coll

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Els vials de Colistimetat de sodi Accord® sense obrir no requereixen cap tipus de conservació especial: temperatura ambient i dins la caixa (protegits de la llum).

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs. Mantenir fora de l'abast als nens.

