

ETANERCEPT (ERELZI®)

Servei de Farmàcia

Erelzi® conté el principi actiu Etanercept.

Etanercept és un agent biològic que actua reduint el dolor i la inflamació associats a certes malalties autoimmunes com l'artritis reumatoide, l'espondilitis anquilosant, l'artritis psoriàsica i la psoriasi.


Com s'ha de prendre?

Erelzi® s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

Erelzi® s'administra un cop per setmana, segons com li hagi prescrit el seu metge. L'hora d'administració és flexible segons la seva preferència.

No administrar si té febre (38°C) i separar la dosi almenys una setmana respecte a les vacunes.

Erelzi® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30-60 minuts abans d'administrar.



Què fer si s'oblida una dosi?

Administri-la el més aviat possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

La dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Erelzi®. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Presentacions comercials

- Erelzi® 50 mg ploma precarregada
- Erelzi® 25 mg xeringa precarregada

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte d'Erelzi®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Erelzi® trobem:

Risc augmentat de patir infeccions (que es poden manifestar amb febre, ferides, malestar general, problemes dentals, tos, molèsties en orinar); inflamació, dolor, envermelliment, pruija en el lloc d'injecció; reacció al·lèrgica (erupció cutània, dificultat per respirar, inflamació de la cara, mans o peus); debilitat en braços o cames; visió doble; formigueig; dolor en el pit; peus i turmells unflats; mal de cap; nàusees i diarrea.

Conservació

Conservi a la nevera (entre 2 i 8°C). No es pot congelar.

Erelzi® té una estabilitat màxima de 4 setmanes fora de la nevera, a una temperatura màxima de 25°C; transcorregut aquest període de temps cal llençar la medicació.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.



Pluma SENSOREADY® (50 mg)*

Jeringa precargada (25 y 50 mg)

