

FILGOTINIB comprimits (Jyseleca®)

Servei de Farmàcia

Jyseleca® conté el principi actiu Filgotinib.

Filgotinib pertany a un grup de medicaments anomenats inhibidors de la Janus Quinasa (JAK), actua reduint l'activitat d'aquest enzim que està involucrat en el procés inflamatori.

Està indicat per al tractament de l'artritis reumatoide activa de moderada a greu i de la colitis ulcerosa activa de moderada a greu en pacients adults.

Com s'ha de prendre?

Jyseleca® s'administra per via oral. S'ha d'empassar el comprimit amb una mica d'aigua i es pot prendre amb aliments o sense.

La dosi recomanada és de 200 mg un cop al dia. El seu metge pot donar-li una dosi més baixa de 100 mg un cop al dia, especialment si té 65 anys o més, antecedents de malaltia cardiovascular arterioscleròtica o altres factors de risc cardiovascular o antecedents de neoplàsia maligna. També es pot decidir reduir la dosi si el medicament està funcionant correctament.

Per facilitar l'administració de Jyseleca®, prengui-ho a la mateixa hora tots els dies.

Què fer si s'oblida una dosi?

Administri Jyseleca® el més aviat possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament i almenys una setmana després de finalitzar-lo.

Si està embarassada o en període de lactància, creu que podria estar-ho o té intenció de quedar-se embarassada, consulti el seu metge o farmacèutic abans d'utilitzar aquest medicament.

Pot produir la reaparició d'alguns virus com l'herpes zòster. Avisar al metge si es produeix.

No es recomana l'ús de vacunes vives atenuades durant el tractament amb Jylseca® o just abans d'iniciar-lo. Cal tenir totes les vacunes actualitzades abans de començar a prendre'l, incloses les vacunes enfront del virus de l'herpes zòster.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Jyseleca® com fenofibrat, carvedilol, diltiazem o simvastatina.

No prengui cap altre medicament sense consultar el seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Jyseleca® trobem:

- Risc augmentat de patir infeccions, com herpes zòster que es pot manifestar en forma d'erupció cutània dolorosa amb ampolles i febre, herpes simple, infeccions del tracte respiratori superior, infeccions del tracte urinari o pneumònia.
- Sensació de malestar a l'estómac (nàusees).
- Mareig.
- Nivells elevats de colesterol en sang observats en anàlisis de sang.
- Nivells elevats de creatina-cinasa observats en anàlisis de sang.
- Disminució dels nivells de limfòcits i neutròfils (defenses).

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat. Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs. La data de caducitat és l'últim dia del mes que s'indica.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

