

GALCANEZUMAB (EMGALITY®)

Servei de Farmàcia

Galcanezumab és un medicament antimigranyós, un anticòs monoclonal humanitzat que s'uneix al pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina (CGRP) i inhibeix la seva activitat biològica. El CGRP és un neuropèptid que modula els senyals nociceptius i un vasodilatador que s'ha associat a la fisiopatologia de la migranya. S'ha observat que els seus nivells augmenten durant la migranya i disminueixen quan s'alleuja.

Està indicat com a profilaxi de la migranya en adults amb almenys 4 dies de migranya al mes. És finançat pel sistema públic en pacients amb almenys 8 dies de migranya/mes (migranya episòdica de freqüència alta i migranya crònica) i que hagin fracassat a almenys 3 tractaments previs.


Com s'ha d'administrar?

Galcanezumab s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

La injecció es pot administrar a l'abdomen, cuixa o en la zona externa de la part superior dels braços.

Posologia: setmana-0 240 mg (2 plomes x 120 mg), setmana-4 120 mg (1 ploma x120 mg) i mantenir c/4setmanes.

Per evitar qualsevol molèstia en el lloc de la punció, s'ha de mantenir la ploma precarregada a temperatura ambient durant almenys 30 minuts abans de la injecció.



Què fer si s'oblida una dosi?

Ha d'administrar-la l'abans possible i contactar amb el metge que li donarà una nova pauta d'administració.

Precaucions

Evitar el seu ús durant l'embaràs. Consultar amb el metge sobre la utilització de galcanezumab durant la lactància. No s'ha avaluat la seva eficàcia i seguretat en pacients amb certes malalties cardiovasculars.

Interaccions amb altres medicaments

No s'ha observat cap interacció significativa. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Presentacions comercials

Presentacions al nostre centre: Emgality® 120 mg ploma precarregada

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents trobem:

- Trastorns del sistema immunològic: reaccions d'hipersensibilitat, erupcions exantemàtiques
- Trastorns a l'oïda i laberint: vertigen
- Trastorns gastrointestinals: restrenyiment
- Trastorns de la pell i del teixit subcutani: pruija, urticària
- Trastorns generals i alteracions en el lloc d'administració: dolor en el punt d'injecció.

Conservació

Conservació en nevera (entre 2 i 8 °C).

Si per accident la medicació queda fora de la nevera, la medicació és estable 7 dies a temperatura ambient (no superior 30°).

No congelar i protegir de la llum.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a618029-es.html>

