

INCLISIRAN (LEQVIO®)

Servei de Farmàcia


Leqvio® conté el principi actiu Inclisiran.

Inclisiran redueix els nivells de colesterol LDL (colesterol “dolent”), un tipus de greix que es troba a la sang, que pot produir problemes de cor i de circulació de la sang quan els nivells estan elevats. El tractament ha d'anar sempre acompanyat de la dieta recomanada pel seu metge.

Com s'ha de prendre?

Leqvio® s'administra per via subcutània (sota la pell) a l'abdomen, la cuixa i la part superior del braç. No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

La dosi recomanada de Leqvio® és de 284 mg en una única injecció administrant una dosi inicial, una segona dosi al cap de 3 mesos, i posteriorment dosis cada 6 mesos. El seu metge li indicarà quina és la seva pauta.



Estableixi un calendari per les administracions de Leqvio® en funció de la primera administració, programant la segona al cap de 3 mesos i les posteriors cada 6 mesos.

Què fer si s'oblida una dosi?

Si es retarda en la presa d'una dosi planificada menys de 3 mesos, administri's la dosi corresponent i segueixi amb el calendari d'administracions establert inicialment sense alterar les següents dosis planificades. La dosi següent l'ha de prendre el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat cap presa.

Si es retarda més de 3 mesos en la presa d'una dosi, haurà de reiniciar el tractament, administrant una dosi inicial, una segona dosi als 3 mesos i posteriorment, dosis repetides cada 6 mesos segons li indiqui el seu metge.

Precaucions

Utilitzar amb precaució en pacients amb insuficiència renal greu i/o insuficiència hepàtica greu.

No es recomana utilitzar Leqvio® durant l'embaràs i es desconeix si s'excreta per la llet materna. Es recomana valorar si cal interrompre el tractament o la lactància.

La influència de Leqvio en la capacitat de conduir i utilitzar màquines es considera nul·la o insignificant.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre: Leqvio® 284 mg xeringa precarregada.

La solució ha de ser clara, entre incolora i lleugerament groga, i estar pràcticament lliure de partícules. No s'ha d'usar la solució si conté fragments de partícules.

Interaccions amb altres medicaments

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Leqvio[®] trobem:

- Inflamació, dolor, envermelliment, pruija en el lloc d'injecció.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Mantenir a l'envàs original a temperatura ambient i protegit de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

