

NIFURTIMOX (LAMPIT®)

Servei de Farmàcia

Lampit® s'utilitza en el tractament de la malaltia de Chagas (tripanosomiasis americana), causada per *Trypanosoma cruzi*. Són comprimits rodons de color groc que tenen una franja al mig. Cada envàs de vidre té 100 comprimits.

Posologia

Lampit® s'administra per via oral tres vegades al dia, després dels menjars. Si es necessita, es poden dividir per la meitat utilitzant la franja del comprimit. En persones que no puguin empassar comprimits sencers es pot administrar polvoritzat i barrejat amb part del menjar.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

Prengui-la tan bon punt se'n recordi, sempre amb menjar.

No prengui mai una dosi doble, ni dosis extres per compensar l'oblit.

Precaucions

No existeixen dades sobre l'ús de Lampit® en embarassades (2n i 3r trimestre). S'excreta en la llet humana en quantitats desconegudes. S'ha de realitzar una avaluació risc/benefici.

Pot haver-hi irritació gastrointestinal si es pren amb antiàcids que continguin hidròxid d'alumini.

El tractament pot fer que tingui menys gana, cal controlar si perd pes de cop.

No es recomana conduir perquè pot causar tremolors que dificultin conduir vehicles i altres màquines.

Contraindicacions

- Pacients amb hipersensibilitat (al·lèrgia) a Nifurtimox, qualsevol hidantoïna o algun dels excipients del medicament.
- Si consumeix alcohol de manera freqüent. Prendre alcohol pot augmentar la freqüència i gravetat de les reaccions adverses.
- Pacients amb porfíria.
- Pacients amb insuficiència hepàtica greu.
- Durant el primer trimestre d'embaràs.

Efectes secundaris

Els més freqüents són:

- Vertigen.
- Dolor abdominal, nàusees, vòmits.
- Disminució de l'apetit, pèrdua de pes.
- Debilitat muscular.
- Amnèsia, polineuropatia, parestèsia, tremolors.
- Apatia, nerviosisme, comportament psicòtic, trastorn del son.

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen alguns d'aquests o altres efectes secundaris.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient (no superior a 30°C) i protegits de la llum i la humitat. No prengui mai el medicament si està caducat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

