


NIRMATRELVIR / RITONAVIR (PAXLOVID®)

Servei de Farmàcia

Cada envàs conté 5 blísters, la medicació per 5 dies de tractament:

- Part daurada (**dosi matí**): 2 comprimits de **nirmatrelvir 150 mg** + 1 comprimit de **ritonavir 100 mg**
- Part blava (**dosi nit**): 2 comprimits de **nirmatrelvir 150 mg** + 1 comprimit de **ritonavir 100 mg**



Com s'han de prendre?

Per cada dosi, s'han de prendre els 3 comprimits alhora: els dos inferiors de nirmatrelvir i el superior de ritonavir (excepció: si reducció de dosi per insuficiència renal, que llavors només cal 2: 1 ritonavir i 1 nirmatrelvir).

Els comprimits s'han de prendre sencers, sense mastegar, triturar ni partir. Es pot prendre amb aliments o sense.

Què fer si s'oblida una dosi?

Si oblida o s'endarrereix una dosi i està dins les 8 hores següents de l'hora programada, pot prendre la medicació.

Si han passat més de 8 hores, no prengui la dosi i esperi a la següent dosi programada, **SENSE** prendre doble dosi.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament i almenys una setmana després de finalitzar-lo.

L'ús de ritonavir pot reduir l'eficàcia dels anticonceptius hormonal combinats. Es recomana utilitzar un mètode anticonceptiu alternatiu eficaç o un mètode anticonceptiu de barrera addicional durant el tractament amb Paxlovid® i fins a un cicle menstrual després de suspendre el tractament.

No es recomana el seu ús durant l'embaràs, a menys que el benefici del tractament superi el risc.

S'ha d'interrompre la lactància durant el tractament i fins 7 dies després de finalitzar el tractament amb Paxlovid®.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Paxlovid® i a l'inrevés. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de començar a prendre la medicació.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Paxlovid® trobem:

- Alteració del gust
- Nàusees i vòmits, diarrea

Conservació

Conservi a temperatura ambient (per sota de 25°C) en un lloc fresc i sec.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs. La data de caducitat és l'últim dia del mes que s'indica.

