

NITAZOXANIDA 500 mg (ALINIA®)

Servei de Farmàcia

Alinia® s'utilitza per al tractament de la giardiasi intestinal, amebiasi intestinal i criptosporidiosi.

Com s'ha de prendre?

És un medicament que es pren via oral. Els comprimits s'han de prendre sencers juntament amb el menjar.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la tan bon punt se'n recordi. Si queda poc temps per a la següent dosi, no prengui l'oblidada i segueixi amb la dosi habitual.

No prengui mai dues dosis alhora, ni dosis addicionals.

Precaucions

No s'ha estudiat l'ús de nitazoxadina ni en l'embaràs ni en la lactància, valorar riscos potencials.

Avisi al seu metge si pren algun medicament amb warfarina o acenocumarol (Sintrom®).

Contraindicacions

Al·lèrgia (hipersensibilitat) a la nitazoxanida o algun dels excipients del medicament.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de nitazoxanida. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans al seu metge o farmacèutic.

Efectes adversos

Entre els efectes adversos més freqüents associats a nitazoxadina trobem:

- Dolor abdominal, nàusees.
- Cefalea.
- Canvi de color de l'orina.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.