

OFATUMUMAB (KESIMPTA®)

Servei de Farmàcia

Kesimpta® conté el principi actiu Ofatumumab, anticòs monoclonal humà (IgG1) específic anti CD20 dels limfòcits B, indicat per al tractament de l'Esclerosi Múltiple.

L'Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia crònica que afecta al sistema nerviós central. En l'EM el sistema immunitari (les defenses de l'organisme) destrueix la coberta protectora (mielina) que recobreix els nervis del sistema nerviós central, aquest fet pot retardar o interrompre la transmissió dels senyals que passen a través de les cèl·lules nervioses i donar lloc als símptomes de l'EM.

L'EM es caracteritza per atacs repetitius de símptomes del sistema nerviós que són un reflex de la inflamació que té lloc en el sistema nerviós central. A aquests atacs se'ls anomena brots.

Kesimpta® està indicat com a tractament modificador del curs de l'EM remitent recidivant en adults. No cura la malaltia.

Com s'ha de prendre?


Kesimpta® s'administra per via subcutània.

La dosi recomanada és un injectable de 20 mg les setmanes 0,1,2,4 i continuar mensualment.

No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

Canvii el lloc d'administració cada cop.

Kesimpta® es conserva al frigorífic (2-8°C). Tregui'l del frigorífic, 30-60 minuts abans d'administrar.



Què fer si s'oblida una dosi?

Administri-la l'abans possible, té un marge de 48-72 h per administrar respecte el dia de referència.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

No administrar si té febre, consultar al seu metge. Respectar intervals amb vacunacions.

No administrar si té al·lèrgia a ofatumumab, o està embarassada.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Interaccions amb altres medicaments

Immunosupressors, pel risc additiu sobre el sistema immune.

Consulti les vacunes compatibles amb el seu metge o farmacèutic de referència.

Efectes secundaris

Els efectes secundaris més comuns són:

- Infeccions freqüents: respiratòries, grip, sinusitis, infeccions d'orina...
- Anèmia, neutropènia.
- Eritema en el lloc d'injecció.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C). No es pot congelar.

Té una estabilitat fora de la nevera durant un període únic de 7 dies a temperatura no superior a 30°C; si no s'utilitza durant aquest període, es pot tornar a guardar a la nevera durant un màxim de 7 dies (en total 14).

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

