

OZANIMOD (ZEPOSIA®)

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté el principi actiu Ozanimod. Forma part d'un grup de medicaments que poden reduir el nombre de glòbuls blancs (limfòcits) que circulen lliurement per l'organisme.

S'utilitza per tractar **l'Esclerosi Múltiple Remitent Recurrent** en pacients adults amb la malaltia activa i també està indicat pel tractament de pacients adults amb **Colitis Ulcerosa** activa de moderada a greu.

L'Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica que afecta al sistema nerviós central. En l'Esclerosi Múltiple el sistema immunitari (les defenses de l'organisme) destrueix la coberta protectora (mielina) que recobreix els nervis del sistema nerviós central, aquest fet pot retardar o interrompre la transmissió dels senyals que passen a través de les cèl·lules nervioses i donar lloc als símptomes de l'Esclerosi Múltiple.

Zeposia® ajuda a combatre els atacs sobre els nervis impedit que certs glòbuls blancs (cèl·lules del sistema immunitari) arribin al cervell i a la medul·la espinal on podrien causar inflamació i danyar la beina protectora dels nervis.

La **Colitis Ulcerosa** és una malaltia inflamatòria de l'intestí. Zeposia® ajuda a reduir la inflamació de la colitis ulcerosa impedit que certs glòbuls blancs arribin al revestiment intestinal.

Posologia

Zeposia® s'administra per via oral, amb aliments o sense, i s'ha d'empassar sencer amb un got d'aigua.

La **dosi inicial** anirà augmentant gradualment durant 7 dies:

- **Dia 1-4:** 0,23 mg un cop al dia (càpsules gris clar).
- **Dia 5-7:** 0,46 mg un cop al dia (càpsules gris clar i taronja).

La **dosi de manteniment a partir del dia 8:** 0,92 mg un cop al dia (càpsules taronja).

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

- Si s'oblida una dosi, prengui-la el més ràpid possible. Si s'oblida la dosi durant un dia sencer, no es prengui la dosi oblidada i prengui's la següent dosi a l'hora habitual.
- Si s'oblida una o més dosis durant els primers 14 dies de començar el tractament, consulti amb el seu metge sobre com reiniciar el tractament.

No prengui una dosi doble per compensar. En cas de qualsevol dubte prengui al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

A l'inici del tractament Zeposia® pot produir bradiarritmia, disminució transitòria del ritme cardíac, aquest fet pot fer que se senti marejat o cansat, que sigui conscient dels batecs del seu cor o que baixi la tensió arterial.

Evitar l'embaràs durant el tractament. S'ha d'interrompre el tractament 3 mesos abans de planificar l'embaràs.

Verificar abans d'iniciar el tractament que no està embarassada.

Les dones en edat fèrtil han de fer servir mètodes anticonceptius efectius durant el tractament i durant els 3 mesos posteriors de la suspensió del tractament.

Evitar la lactància materna si està prenent Zeposia®.

En pacients diabètics pot augmentar el risc d'edema macular.

Informi al seu metge si: pren medicaments pel batec cardíac, si té un ritme cardíac lent o irregular, si té o ha tingut problemes de cor, si té pensat vacunar-se o no ha tingut la varicel·la.

Efectes secundaris

Els **efectes secundaris** més freqüents de Zeposia®, són:

- Nasofaringitis
- Limfopènia (nivell baix de glòbuls blancs)
- Herpes zòster i herpes simple
- Infeccions del tracte urinari i del tracte respiratori
- Cefalea
- Bradicàrdia, hipertensió, hipotensió ortostàtica
- Edema perifèric

Interaccions

No administrar Zeposia® si pren tractament antineoplàsic, immunosupressor o immunomodulador.

Zeposia® pot interaccionar amb: inhibidors potents (ciclosporina, gemfibrozil i clopidogrel), inductors potents (rifampicina), inhibidors de la MAO (selegilina, fenelzina), Beta-bloquejants, antagonistes del calci, vacunes vives atenuades.

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs. La data de caducitat és l'últim dia del mes que s'indica.

