

PEGINTERFERÓ α 2A (PEGASYS®)

Servei de Farmàcia

Pegasys® conté el principi actiu Peginterferó α 2a. El peginterferó α 2a és un conjugat covalent de la proteïna interferó α 2a obtingut mitjançant tecnologia d'ADN recombinant E. Coli amb bis-monometoxipoliètilenglicol. El peginterferó α 2a té una activitat antivírica i antiproliferativa.

L'Hepatitis Delta és una malaltia hepàtica causada pel virus de l'hepatitis delta (VHD), un virus defectuós que necessita per a la seva replicació i persistència en el cos que existeixi el seu antigen de superfície (HBsAg). El VHD és un petit virus que per a fer el seu cicle de replicació necessita el virus de l'hepatitis B (VHB). La infecció pel VHD es pot produir quan ja es té el VHB (sobreinfecció) o bé, es pot produir amb una infecció simultània del VHB amb el VHD (coïnfecció). Es poden presentar símptomes com: cansament, pèrdua de la gana, febre, mal de cap i a vegades, nàusees, vòmits i icterícia (pigmentació groga de la pell).

Pegasys® no està indicat en fitxa tècnica com a tractament de l'hepatitis delta, però hi ha prou evidència mèdica per a la seva utilització en el tractament d'aquesta malaltia.

Com s'ha de prendre?

Pegasys® s'administra per via subcutània.


La dosi recomanada és d'un injectable de 180 mcg

setmanalment durant 48 setmanes, sempre el mateix dia de la setmana i sempre que sigui possible, a la mateixa hora del dia.


No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

Canviï de lloc d'administració cada cop.

Pegasys® es conserva al frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar-lo.



Passos a seguir:



Què fer si s'oblida una dosi?

- **Si passen 1-2 dies:** injectar la dosi com més aviat millor. Continui amb la següent dosi segons el calendari programat.
- **Si passen 3-5 dies:** injectar la dosi com més aviat millor i les dosis següents se les ha d'injectar en intervals de 5 dies fins que es recuperi el ritme setmanal previst, és a dir, fins que li torni a tocar la injecció el dia de la setmana que se la injecta normalment.
- **Si passen 6 dies:** s'ha d'esperar a injectar-se la dosi el següent dia per a mantenir el ritme habitual.

No s'ha de prendre una dosi doble per a compensar les dosis oblidades.

Precaucions

No administrar si té al·lèrgia a interferó, depressió greu activa, diabetis no controlada, reaccions d'hipersensibilitat immediates (urticària, angioedema, broncoespasme, anafilaxi) alteració de la funció pulmonar o empitjorament de lesions psoriàsiques.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Pegasys® com telbivudina, teofil·lina, azatioprina i metadona. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Els efectes adversos **més freqüents** en monoteràpia amb Pegasys® són:

- Generals: calfred, dolor, reacció en el lloc de la injecció, irritabilitat.
- Digestius: diarrea, nàusees, dolor abdominal.
- Neurològics/psicològics: mareig, depressió, insomni.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi a la nevera (entre 2 i 8 °C) i no el pot congelar.

Pegasys® s'ha de conservar dins l'embalatge exterior per a protegir-lo de la llum.

Mantenir fora de la vista i l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs. La data de caducitat és l'últim dia del mes que s'indica.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a605029-es.html>

