

PONESIMOD (PONVORY®)

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté el principi actiu Ponesimod i s'utilitza per tractar l'Esclerosi Múltiple Remitent Recurrent en pacients adults amb la malaltia activa.

L'Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica que afecta al sistema nerviós central. En l'Esclerosi Múltiple el sistema immunitari (les defenses de l'organisme) destrueix la coberta protectora (mielina) que recobreix els nervis del sistema nerviós central, aquest fet pot retardar o interrompre la transmissió dels senyals que passen a través de les cèl·lules nervioses i donar lloc als símptomes de l'Esclerosi Múltiple.

L'Esclerosi Múltiple es caracteritza per atacs repetitius de símptomes del sistema nerviós que són un reflex de la inflamació que té lloc en el sistema nerviós central. A aquests atacs se'ls anomena brots.

Els símptomes dels brots varien d'un pacient a un altre, però generalment consisteixen en: dificultat per caminar, pèrdua de sensibilitat o formigueig, problemes de visió i trastorns en l'equilibri.

Ponvory està indicat en monoteràpia com a tractament modificador del curs de la malaltia. No cura la malaltia, però ajuda a reduir la lesió de les cèl·lules nervioses al dificultar que el sistema immunitari ataqüi al sistema nerviós central. Al deixar de prendre el medicament augmenten les defenses i ja no tenim l'efecte terapèutic.

Posologia

Ponvory s'administra per via oral una càpsula al dia, amb aliments o sense, s'ha d'empassar sencera amb un got d'aigua.

Els primers 14 dies es segueix una pauta escalonada amb l'envàs d'inici que conté diferents dosis:

- | | |
|-------------------|--|
| • Dia 1 i 2: 2 mg | • Dia 9: 7 mg |
| • Dia 3 i 4: 3 mg | • Dia 10: 8 mg |
| • Dia 5 i 6: 4 mg | • Dia 11: 9 mg |
| • Dia 7: 5 mg | • Dia 12, 13 i 14: 10 mg |
| • Dia 8: 6 mg | • A partir del 15è dia prendre la dosi de manteniment de 20 mg |

Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi. No deixi de prendre Ponvory sense abans comentar-li al seu metge.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

En el cas que s'oblidi d'1 a 4 dosis consecutives, continuï amb la primera dosi oblidada.

Si ha oblidat més de 4 dosis consecutives: comuniqui-ho al metge i haurà de reiniciar des de la dosi de 2 mg amb l'envàs d'inici fins a tornar a ajustar la dosi.

No prengui una dosi doble per compensar. En cas de qualsevol dubte, pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

A l'inici del tractament Ponvory pot produir-se bradiarítmia, disminució transitòria del ritme cardíac, aquest fet pot fer que se senti marejat o cansat, que sigui conscient dels batecs del seu cor o que baixi la tensió arterial.

En el cas que es suspengui la medicació durant un període superior a dues setmanes, al reiniciar el tractament s'haurà de tornar a fer sota control mèdic.

Si durant el tractament amb Ponvory té febre o símptomes semblants a la grip, informi al seu metge ràpidament. Evitar l'embaràs durant el tractament i fins dos mesos després de finalitzat. Verificar abans d'iniciar el tractament que no està embarassada.

Evitar la lactància materna si està prenent Ponvory.

En pacients diabètics pot augmentar el risc d'edema macular.

Informi al seu metge si: pren medicaments pel batec cardíac, si té un ritme cardíac lent o irregular, si té o ha tingut problemes de cor i si té pensat vacunar-se o no ha tingut la varicel·la.

Efectes secundaris

Els efectes secundaris més freqüents de Ponvory són:

Infeccions per virus del constipat comú i del tracte respiratori superior i increment dels enzims hepàtics.

Interaccions

No administrar Ponvory si pren tractament antineoplàsic, immunosupressor o immunomodulador.

Ponvory pot interaccionar amb: Beta-bloquejants, vacunes vives atenuades o inductors potents (anticonvulsionants, espironolactona, alcohol, rifampicina).

Conservació

Mantingui els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

