

TAFAMIDIS (VYNDAQEL®)

Servei de Farmàcia

VYNDAQEL® conté el principi actiu Tafamidis.

Tafamidis està indicat en el tractament de l'amiloïdosi per transtiretina nativa o hereditària en adults amb miocardiopatia (ATTR-CM), una afectació en què la proteïna transtiretina s'acumula a les parets del cor, fent-les més gruixudes i dificultant la seva capacitat de bombeig de sang.

Tafamidis estabilitza la proteïna transtiretina evitant que s'acumuli a les parets del cor.

Com s'ha de prendre?

VYNDAQEL® 61 mg s'administra per via oral, una vegada al dia. Tot i no existir una hora específica del dia per a l'administració, es recomana fer-ho sempre a la mateixa hora.

S'ha de prendre la càpsula sencera acompanyada d'un got d'aigua i amb aliments o sense. No trituri ni trenqui la càpsula, ja que perdria efecte.

Si després de prendre la dosi habitual vomita i pot identificar la càpsula sencera, prengui una dosi extra. Si no pot identificarla, no prengui cap dosi addicional i segueixi amb la pauta habitual.

Què fer si s'oblida una dosi?

Administri la càpsula l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

La dosi següent s'administrarà el dia següent a l'hora que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament i, com a mínim, durant 4 setmanes després de finalitzar-lo.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Si té la intenció de quedar-se embarassada, consulti el seu metge o farmacèutic abans d'utilitzar aquest medicament.

Vindaqel® conté sorbitol en la seva composició, que és una font de fructosa. Cal tenir en compte els possibles efectes additius amb altres fàrmacs que continguin sorbitol o fructosa i la ingesta alimentària.

Presentacions

Vyndaqel® 61 mg en càpsules.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Vyndaqel®, com per exemple metotrexat, rosuvastatina i imatinib. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Vyndaqel® pot alterar resultats de proves analítiques, principalment sobre la funció renal i tiroïdal. Informi al seu metge que està prenent Vyndaqel® per a la correcta interpretació dels resultats.

El contingut de sorbitol pot alterar la biodisponibilitat d'altres medicaments.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Vyndaqel® trobem:

- Diarrea
- Erupció i pruíja

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Mantingui les càpsules a l'envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

