

TEZEPELUMAB (TEZSPIRE)

Servei de Farmàcia

Tezepelumab és un agent biològic, anticòs monoclonal dirigit contra la Linfopoietina Estromal Tímica (TSLP) que redueix un gran ventall de citoquines proinflamàtores de les vies respiratòries. Tant en l'asma al·lèrgica com no al·lèrgica s'augmenta la producció de TSLP.

Com s'ha d'administrar?


Tezepelumab s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, descamada, tingui un blau o estigui dura. Evitar també zones amb cicatrius.

La dosi és de 210 mg cada 4 setmanes.

Tezepelumab es conserva al frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30-60 minuts abans d'administrar-lo.

En cas de tenir febre alta ($>38^{\circ}\text{C}$), retardar l'administració. En cas de vacunar-se, retardar també l'administració almenys 5 dies.

A quines zones es pot administrar? A les zones grises del dibuix.



Què fer si s'oblida una dosi?

Administrar-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

La dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Tezepelumab. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Tezepelumab 210 mg Ploma precarregada

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Tezepelumab. Evitar l'ús de vacunes vives atenuades.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a tezepelumab trobem:

- Risc augmentat de patir infeccions (faringitis); inflamació, dolor, envermelliment, pruija en el lloc d'injecció; reacció al·lèrgica (erupció cutània), dificultat per respirar, inflamació de la cara, mans o peus; erupcions cutànies; artràlgia.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi a la nevera (entre 2 i 8°C). No s'ha de congelar.

Ha de mantenir el medicament al seu envàs original fins al moment de l'administració, ja que s'ha de protegir de la llum.

Si per accident la medicació queda fora de la nevera, la medicació és estable 30 dies a temperatura ambient (màxima 25°C). Si ha de viatjar, ha de transportar el seu medicament en una nevera refrigerada portàtil i guardar-ho el més aviat possible a la nevera.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

