

## VEDOLIZUMAB 108 mg (ENTYVIO®)

### *Servei de Farmàcia*

Vedolizumab és un anticòs monoclonal que bloqueja l'acció de la integrina  $\alpha 4\beta 7$ , un mediador de la inflamació gastrointestinal.

Està indicat en el tractament de la Malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa.

### **Com s'ha d'administrar?**


Vedolizumab s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

La pauta de manteniment és 108 mg (una ploma o xeringa) cada dues setmanes. Triï un dia de la setmana i administri vedolizumab el mateix dia a la mateixa hora una setmana sí i una setmana no. No afecta la conducció, el son ni l'alimentació. Almenys les primeres 2 dosis s'administren per via intravenosa a l'hospital de dia (0, 2, 6).

Vedolizumab es conserva al frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar.

On es pot administrar? Abdomen, cuixes, glutis, deltoides (imatge).

En cas de tenir febre alta ( $>38^{\circ}\text{C}$ ), retardar l'administració. En cas de vacunar-se, retardar també l'administració almenys 5 dies.



### **Què fer si s'oblida una dosi?**

Administrar-la com més aviat sigui possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

La dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

### **Precaucions**

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins 18 setmanes després de l'última dosi. Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància, ja que vedolizumab passa a la llet materna, però falta evidència sobre les possibles repercussions.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Adalimumab. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

### **Presentacions comercials**

Presentacions al nostre centre:

- Vedolizumab 108 mg ploma precarregada

### ***Interaccions amb altres medicaments***

Sense interaccions farmacològiques rellevants, excepte vacunes vives atenuades. No es recomana l'ús concomitant amb altres immunosupressors biològics (natalizumab i rituximab) per falta d'evidència.

### ***Efectes secundaris***

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Vedolizumab trobem: mal de cap, dolor en les articulacions, infeccions víriques com el refredat comú, infeccions de les vies respiratòries altes (bronquitis i sinusitis), nàusees, fatiga, tos i reacció al lloc d'administració.

### ***Conservació***

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C). NO CONGELAR.



Té una estabilitat de màxim 7 dies a temperatura ambient (25°C), però no es pot tornar a guardar a la nevera sinó que transcorregut el període s'hauria de llençar en cas de no haver-se utilitzat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

### ***Caducitat***

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

