

VORICONAZOL

Servei de Farmàcia

Què és Voriconazol?

És un antifúngic que s'utilitza en cas d'infeccions per fongs i com a prevenció d'infeccions fúngiques en pacients trasplantats de medul·la òssia.



Quina dosi he de prendre?

La dosi habitual és de 400 mg (2 comprimits) cada 12 hores el primer dia, 200 mg (1 comprimit) cada 12 hores els següents. La dosi serà inferior si el seu pes és <40 kg.

Excipients: midó, lactosa*

*altres marques contenen distints excipients

Horari																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

Com hauria de prendre Voriconazol?

Haurà de prendre la dosi indicada sense aliments (almenys 1 hora abans o 1 hora després del menjar) 2 vegades al dia.

No fraccioni ni mastegui qui els comprimits.

Què ha de fer si oblida una dosi?

No prengui la dosi oblidada, i continuï el seu tractament a la següent dosi programada. Mai prengui una dosi doble per a compensar una dosi oblidada.

En cas de vòmit, no prengui una altra dosi aquest dia, i continuï el seu tractament a la següent dosi programada.

Què ha d'explicar-li al seu metge i farmacèutic abans de començar el tractament?

- Si és al·lèrgic a Voriconazol o a algun dels seus excipients.
- Historial de malaltia del fetge o del cor.
- Abans d'administrar qualsevol vacuna, consulti amb el seu farmacèutic.
- Embaràs i lactància.

Quins efectes adversos puc tenir?

- Molt freqüents (1 de cada 10 persones): dolor abdominal, nàusees, vòmits, diarrea, retenció de líquids a les extremitats, mal de cap, alteració de la visió, dificultat per a respirar, erupcions a la pell i febre.
- Freqüents (5 de cada 100 persones): disminució de glòbuls blancs, vermells i plaquetes en sang, baixada del nivell de sucre en sang, restrenyiment, sinusitis, mala digestió, caiguda de cabell, mal d'esquena, alteració del ritme del cor, tensió arterial baixa, ansietat i insomni.
- Greus (menys d'1 cada 1000 persones): trastorns cardíacs.

Podem alleujar alguns d'aquests símptomes seguint les instruccions del full "Què faig sí?"

Voriconazol pot interaccionar amb altres medicaments?

Voriconazol pot ser incompatible amb altres tractaments, ha d'informar al seu metge i farmacèutic de tota la medicació i productes naturals que prengui. Alguns dels medicaments que poden interaccionar són:

Antiepilèptics (fenobarbital, carbamazepina, fenitoïna), antivirals (ritonavir, efavirenz), rifabutina, ergotamina
Fàrmacs que també prolonguen l'interval QT cardíac com amiodarona, azitromicina, cisaprida, citalopram, cloroquina, domperidona, haloperidol, metadona, pimozida, procaïnamida, sotalol, entre altres.
Herba de Sant Joan

Com he de conservar Voriconazol?

- A temperatura ambient, allunyat de la humitat, la calor i la llum. Ha de conservar els comprimits a l'envàs original.
- En el cas que li sobri medicació, torni-la l'abans possible al Servei de Farmàcia del seu Hospital.
- No utilitzi aquest medicament després de la data de caducitat que apareix a la caixa després de "CAD". La data de caducitat és l'últim dia del mes que s'indica.

Observacions: Ha de protegir-se de la llum durant el tractament amb Voriconazol. Utilitzi màniga llarga i factor de protecció major que 15.