

VANCOMICINA (Càpsules 125 mg)

Servei de Farmàcia

Aquest medicament conté el principi actiu vancomicina. No està comercialitzat a Espanya i es fabrica per formulació magistral en farmàcies autoritzades.

Vancomicina és un antibiòtic peptídic indicat, per via oral, pel tractament de colitis o diarrees severes causades per la infecció per *Clostridiodes difficile*.

Com s'ha de prendre?

Vancomicina càpsules s'administra per via oral amb un got d'aigua.

La dosi recomanada és de 125 mg cada 6 hores durant 10 dies. Pot variar segons la patologia i el seu metge li indicarà el tractament individualitzat a seguir.

Cal prendre la dosi i durada exacta que li ha prescrit el seu metge.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada. Prengui'l amb un àpat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Si creu que pot estar embarassada informi al seu metge.

No administrar en pacients amb:

- Hipersensibilitat a vancomicina o teicoplanina (s'han detectat reaccions al·lèrgiques creuades).
- Hipersensibilitat a algun dels seus excipients.

El bacteri causant de la infecció es pot propagar de persona a persona o per contacte amb superfícies contaminades. Per això, és molt important que la persona afectada, els cuidadors i familiars es rentin freqüentment les mans amb aigua i sabó, en especial, abans i després dels àpats i en utilitzar el lavabo.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de la vancomicina.

No prengui colestiramina (resines d'intercanvi iònic usades al tractament de la hipercolesterolèmia), ja que pot alterar la seva absorció. S'ha d'espaiar la seva presa com a mínim 3 – 4 hores.

Si està prenent medicaments per a tallar la diarrea o inhibidors de la bomba de protons (com l'omeprazol), consulti si ha de seguir prenent-los.

Si pren probiòtics, s'ha d'espaiar la seva presa com a mínim 2 hores.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Aquest fàrmac actua de manera local a l'intestí, per tant, no s'esperen efectes adversos en la seva administració sistèmica. Normalment, és ben tolerat, no obstant poden aparèixer símptomes gastrointestinals com dolor abdominal, nàusees i vòmits.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos o qualsevol altre no descrit.

Conservació

Conservi a temperatura ambient (per sota de 30°C) en un lloc fresc i sec.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.