

USTEKINUMAB (PYZCHIVA®)

Servei de Farmàcia

Pyzchiva® conté el principi actiu Ustekinumab.

Ustekinumab és un agent biològic indicat per al tractament de la psoriasi, artritis psoriàsica i la malaltia de Crohn.

Com s'ha de prendre?

Pyzchiva® s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, descamada, tingui un blau o estigui dura. Evitar també zones amb cicatrius.

Pyzchiva® s'administra una dosi inicial, seguida d'una altra dosi 4 setmanes després, i posteriorment una dosi cada 12 setmanes (3 mesos).

Pyzchiva® es conserva al frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar. No agitar.


No utilitzar en cap cas la resta de producte que quedi a la xeringa.

No utilitzar Pyzchiva® si la solució presenta un canvi de color o alguna terbolesa o si s'observen partícules estranyes.

Què fer si s'oblida una dosi?

Consulti al seu metge o farmacèutic.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.



Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins 4 mesos després de finalitzar-lo.

Si es quedés embarassada durant el tractament, cal informar immediatament al seu metge.

Evitar la lactància durant el tractament i fins 4 mesos després de finalitzar-lo.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Pyzchiva®. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Pyzchiva® 45 mg xeringa precarregada
- Pyzchiva® 90 mg xeringa precarregada

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Pyzchiva®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Pyzchiva® trobem:

Risc augmentat de patir infeccions de les vies respiratòries, mal de coll, congestió nasal, depressió, mareig, mal de cap, diarrea, mal d'esquena i muscular, cansament i envermelliment i picor (pruïja) en el lloc d'injecció.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi a la nevera (entre 2 i 8°C).

Conservar la xeringa precarregada dins l'embalatge per protegir-la de la llum.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs. La data de caducitat és l'últim dia del mes que s'indica.

Hàbits saludables

Per la psoriasi, és important establir una rutina:

- Dutxa diària preferentment al matí amb un sabó suau en poca quantitat. Esbandir bé. A continuació, aplicar el tractament tòpic prescrit pel seu metge i la loció corporal hidratant.
- A la nit hidratar i tractar les zones afectades.
- A l'hivern: hidratar les mans i protegir-se del fred. La roba més enganxada al cos ha de ser de fibres naturals com el cotó.
- A l'estiu prendre el sol evitant les hores del migdia (de 12 h a 16 h). Aplicar protecció solar resistent a l'aigua 20 minuts abans de l'exposició. Repetir l'aplicació periòdicament.
- L'aigua del mar és beneficiosa pels pacients amb psoriasi, malgrat que la sal pugui produir picor.
- L'aigua de la piscina conté productes que poden irritar i ressecar la pell. Dutxar-se després del bany.
- Fer exercici regularment.
- Prendre una dieta equilibrada limitant els greixos.

