

RISANKIZUMAB (SKYRIZI®) 360 mg

Servei de Farmàcia

Skyrizi® conté el principi actiu Risankizumab, és un anticòs monoclonal indicat en el tractament de la malaltia de Crohn activa de moderada a greu que ha tingut una resposta inadequada, ha perdut resposta o ha estat intolerant al tractament convencional o a un fàrmac biològic.


Risankizumab és un anticòs monoclonal humanitzat de tipus immunoglobulina G1 (IgG1) que s'uneix selectivament i amb alta afinitat a la subunitat p19 de la interleucina 23 (IL-23). La IL-23 és una citocina que participa en les respostes inflamatòries i immunitàries. En l'impedir la unió de IL-3 al seu receptor, risankizumab inhibeix la senyalització cel·lular dependent de IL-23 i l'alliberació de citocines proinflamatòries.

Com s'ha d'administrar?

S'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau, ferida o estigui dura.

La dosi recomanada és de 360 mg la setmana 12 (després del tractament endovenós), i posteriorment cada 8 setmanes.

Les injeccions s'han d'administrar en localitzacions anatòmiques diferents (com les cuixes o l'abdomen).




Treure de la nevera 45-60 minuts abans de l'administració.

Inspeccionar l'injector i el contingut del cartutx.

Obrir totalment la porta grisa. Introduir el cartutx, pressionant la part superior fins que se senti un "clic".


Tancar la porta grisa.



Retirar les pestanyes de la part posterior de l'injector.

Primer retirar la secció més gran i després la part petita.

Un cop retirada aquesta última, s'activarà l'injector i hi haurà una llum intermitent de color blau. S'ha d'utilitzar en els següents 30 minuts.



Col·locar l'injector a la part on es vulgui administrar la medicació, que quedi la llum de manera visible.

Repassar amb el dit que l'injector hagi quedat ben adherit. Pressionar el botó d'inici.

Sentirà un "clic" i la llum intermitent passa a ser de color verd.

Pressionar una mica l'injector per evitar que es mogui.



"clic"

L'administració pot trigar uns 5 minuts. Durant aquest temps la llum seguirà intermitent en verd i sentirà sorolls de bombeig.

Un cop finalitzada la injecció sentirà un xiulet i la llum quedarà en verd de manera fixe.

Ja podrà retirar l'injector. Revisar que la llum estigui apagada i que a l'èmbol blanc ocupi tota la finestra d'administració. Si és així, dipositar-lo al contenidor de residus. Si no és així, avisar al farmacèutic.

Què fer si s'oblida una dosi?

Administri-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

La dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar anticonceptius eficaços fins 21 setmanes després de la finalització del tractament.

Evitar el seu ús durant l'embaràs i la lactància.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Skyrizi®. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

- Skyrizi® 360 mg solució injectable en cartutx.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Skyrizi®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

- Risc augmentat de patir infeccions (que es poden manifestar amb febre, ferides, malestar general, problemes dentals, tos, molèsties a l'orina, infeccions en vies respiratòries).
- Alteracions en el lloc d'injecció: inflamació, dolor, envermelliment i pruit.
- Cefalea.
- Fatiga.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

Conservació

Conservi en nevera (entre 2-8°C). Fora de la nevera, es conserva fins a un màxim de 24 hores. Mantenir sempre dins de l'envàs original per protegir de la llum.

No congelar.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>