

ATOGEANT (AQUIPTA®)

Servei de Farmàcia

Atogepant és un fàrmac que s'utilitza per al tractament preventiu de la migranya en adults. La pauta habitual és atogepant 60 mg (1 comprimit) un cop al dia. En casos d'insuficiència renal i/o ús concomitant amb inhibidors potents de CYP3A4 o OATP (polipèptid transportador d'anions orgànics), cal ajustar la dosi a 10 mg (1 comprimit) un cop al dia.

Com s'ha de prendre?

Aquipta® s'administra per via oral, amb un got d'aigua i amb aliments o sense.

Els comprimits s'han de prendre sencers, no es recomana mastegar, triturar o partir els comprimits.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la l'abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que l'oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

No es recomana VYDURA:

- en pacients amb insuficiència hepàtica greu;
- en ús concomitant amb inhibidors potents del CYP3A4;
- en ús concomitant amb inhibidors potents de l'OATP.

Hi ha poques dades respecte als riscos de tractar-se amb ATOGEANT i el desig gestacional, la gestació i la lactància. En general, s'ha d'evitar el tractament amb ATOGEANT en usuàries que vulguin quedar-se embarassades, durant l'embaràs i la lactància.

Interaccions amb altres medicaments

Si preneu qualsevol medicament (ja sigui un receptat o de venda lliure, productes naturals o vitamines) que no s'hagi de prendre juntament amb aquest medicament, com certs medicaments que s'utilitzen per tractar el VIH, infeccions, convulsions i altres.

Hi ha molts medicaments que poden interaccionar amb aquest (sobretot els fàrmacs que són inhibidors del CYP3A4 i inhibidors de l'OATP).

Efectes secundaris

Tots els medicaments poden tenir efectes secundaris. No obstant això, moltes persones no tenen cap efecte secundari o només tenen efectes secundaris menors com nàusees, estrenyiment, disminució del pes, fatiga/somnolència, augment d'enzims hepàtics.

Tot i que és molt poc freqüent, algunes persones poden patir efectes secundaris molt greus. Si presenteu algun dels següents signes o símptomes informeu al vostre metge o cerqueu assistència mèdica immediatament: signes de reacció al·lèrgica tals com erupció cutània; urticària; picor; pell vermella, inflada, amb butllofes o escamada, amb febre o sense; sibilància; opressió al pit o a la gola; problemes per respirar, empassar o parlar; ronquera inusual; o inflor de la boca, la cara, els llavis, la llengua o la gola.

Conservació

Emmagatzemar a temperatura ambient en un lloc sec. No emmagatzemar en un bany. Conserveu aquest medicament al blíster. Guardeu els vostres medicaments en un lloc segur. Mantenir tots els medicaments fora de l'abast dels nens i animals de companyia.

Rebutgi els medicaments sense fer servir o que hagin expirat. No els llenci pel vàter ni els aboqui al desguàs llevat que així ho indiquin. Existeixen programes de recollida de medicaments no-utilitzats/caducats a les oficines de farmàcia (punt Sigre) per una gestió integral del residu medicament.

Caducitat

Veure l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

