

RILUZOL (Emlif®, pel·lícula bucodispersable)

Servei de Farmàcia

És un medicament que conté el principi actiu riluzol que actua a nivell del sistema nerviós central i s'utilitza per tractar l'Esclerosi Lateral Amiotròfica.

Posologia

Riluzol s'administra per via oral, cada 12 hores, és a dir, dos cops al dia. Cal prendre Riluzol diàriament, a la mateixa hora, i no saltar-se cap dosi. No deixi de prendre Riluzol sense abans comentar-li al seu metge.

Rentar bé les mans, ABANS i DESPRÉS de prendre el medicament.

Doblegar el sobre d'alumini per la línia contínua de la part superior. Mentre manté doblegada la part superior del sobre per la línia contínua, tirar cap avall de l'obertura lateral en el sentit de la fletxa per a obrir el sobre. Treure del sobre d'alumini la pel·lícula bucodispersable. Cada sobre conté una dosi (pel·lícula), i no ha de doblegar-se.

Posar-se la pel·lícula sobre la llengua; la pel·lícula s'enganxarà a ella i començarà a dissoldre's. Una vegada que hagi tancat la boca, empassar-se la saliva amb normalitat a mesura que la pel·lícula es dissol. No parlar fins que la pel·lícula s'hagi dissolt/desfet completament.

Emlif no s'ha de prendre amb líquids, mastegar ni escopir. Evitar aliments.

Què fer si s'oblida de prendre una dosi?

En cas que s'oblidi una dosi: NO la prengui i esperi a la propera toma i continuï tal com ho té prescrit.

No prengui una dosi doble per compensar l'oblit. En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Aquest medicament està contraindicat durant l'embaràs i la lactància. No es recomana en dones amb desig gestacional, doncs pot alterar la fertilitat.

També pot provocar somnolència, vertigen o mareig, en el cas que vostè presenti aquests efectes es recomana no conduir vehicles ni utilitzar màquines.

Efectes secundaris

Els efectes secundaris més freqüents de Riluzol són:

- Disminució de la sensació oral, mal de cap, mareig, somnolència, nàusees, diarrea, dolor abdominal, vòmits, alteracions de les proves hepàtiques i cansament.

Interaccions

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Riluzol (relacionats amb el CYP1A2). La seva farmacèutica revisarà les possibles interaccions i rellevància clínica. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural, sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Conservació

Mantenir les pel·lícules bucodispersables en el seu envàs original, i només s'han d'extreure quan sigui l'hora de la seva administració. Mantenir a temperatures inferiors a 30°C i fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

