

RIMEGEPANT (VYDURA®)

Servei de Farmàcia

Rimegepant és un fàrmac que s'utilitza per al tractament agut i preventiu de la migranya. La pauta habitual és rimegepant 75 mg (1 comprimit) cada 2 dies, essent la dosi màxima d'1 comprimit al dia.

Com s'ha de prendre?

- No retirar aquest medicament del blíster fins que estigui llest per utilitzar-lo. No guardar el medicament que va retirar del blíster per utilitzar-lo posteriorment.
 - Enretirar l'alumini del blíster. No empènyer el comprimit fora de l'embolcall d'alumini quan l'obri. Amb les mans seques, retirar-lo de l'embolcall d'alumini. Col·locar sobre la llengua i deixar que es dissolgui. No es requereix aigua. No mastegar, ni triturar, ni trencar el comprimit.
- Si cal, pot dissoldre el comprimit sota la llengua.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prendre la dosi que es va saltar al més aviat possible.

Si ja gairebé és hora de la dosi següent, saltar-se la dosi oblidada i continuar amb l'horari habitual.

No prendre dues dosis alhora ni prendre dosis addicionals.

Precaucions

No es recomana VYDURA:

- en usuaris/usuàries amb insuficiència hepàtica greu;
- en usuaris/usuàries amb malaltia renal terminal;
- en ús concomitant amb inhibidors potents del CYP3A4;
- en ús concomitant amb inductors potents o moderats del CYP3A4.

Hi ha poques dades respecte els riscos de tractar-se amb RIMEGEPANT i el desig gestacional, la gestació i la lactància. En general, s'ha d'evitar el tractament amb RIMEGEPANT en usuàries que vulguin quedar-se embarassades, durant l'embaràs i la lactància. Les opcions per aquestes usuàries s'han de considerar com a part d'un procés de presa de decisions compartida.

Interaccions amb altres medicaments

Si preneu qualsevol medicament (ja sigui un receptat o de venda lliure, productes naturals o vitamines) que no s'hagi de prendre juntament amb aquest medicament, com certs medicaments que s'utilitzen per tractar el VIH, infeccions, convulsions i altres.

Hi ha molts medicaments que poden interaccionar amb aquest (sobretot els fàrmacs que són inhibidors o inductors potents del CYP3A4 i inhibidors només de la P-gp i la BCRP).

Efectes secundaris

Tots els medicaments poden tenir efectes secundaris. No obstant això, moltes persones no tenen cap efecte secundari o només tenen efectes secundaris menors com nàusees, dolor i cremor d'estómac.

Tot i que és molt poc freqüent, algunes persones poden patir efectes secundaris molt greus. Si presenteu algun dels següents signes o símptomes informeu al vostre metge o cerqueu assistència mèdica immediatament: signes de reacció al·lèrgica tals com granellada; urticària; picor; pell vermella, inflada, amb butllofes o escamada, amb febre o sense; sibilància; opressió al pit o a la gola; problemes per respirar, empassar o parlar; ronquera inusual; o inflor de la boca, la cara, els llavis, la llengua o la gola.

Conservació

Emmagatzemar a temperatura ambient en un lloc sec. No emmagatzemar en un bany. Conserveu aquest medicament al blíster. Guardeu els vostres medicaments en un lloc segur. Mantenir tots els medicaments fora de l'abast dels nens i animals de companyia.

Rebutgi els medicaments sense fer servir o que hagin expirat. No els llenci pel vàter ni els aboqui al desguàs llevat que així ho indiquin. Existeixen programes de recollida de medicaments no-utilitzats/caducats a les oficines de farmàcia (punt Sigre) per una gestió integral del residu medicament.

Caducitat

4 anys des de producció (veure envàs).

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

