

TRALOKINUMAB (ADTRALZA®)

Servei de Farmàcia

Adtralza® conté el principi actiu tralokinumab, un anticòs monoclonal indicat pel tractament de la dermatitis atòpica.

És un anticòs monoclonal completament humà que bloqueja l'acció d'una proteïna anomenada interleucina 13 (IL-13). La IL-13 juga un paper clau en l'aparició dels signes i símptomes de la dermatitis atòpica.


Com s'ha d'administrar?

La dosi recomanada de tralokinumab en pacients adults i adolescents a partir de 12 anys és una **dosi inicial de 600 mg** (administrats mitjançant dues injeccions de 300 mg), seguida de **300 mg cada dues setmanes**.

S'administra per injecció subcutània (sota la pell).

No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o cicatriu o estigui dura.

Es pot administrar en abdomen, cuixa o zona externa de la part superior dels braços.



Què fer si s'oblida una dosi?

Ha d'administrar-la l'abans possible i contactar amb el metge que li donarà una nova pauta d'administració.

Precaucions

En cas d'embaràs, utilitzar tralokinumab sota la recomanació del metge després d'avaluar la relació benefici/risc.

Interaccions amb altres medicaments

Es recomana tenir al dia el calendari de vacunes previ a l'inici del tractament i tenir en compte que no s'ha establert seguretat i eficàcia clínica amb vacunes vives o atenuades amb la teràpia biològica. Consensuar amb el seu metge.

Presentacions comercials

- Adtralza® 300 mg sol injectable en ploma precarregada.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents trobem:

- Risc d'infeccions del tracte respiratori superior: refredat comú
- Trastorns en el lloc d'injecció: reaccions en el lloc d'injecció
- Trastorns oculars: conjuntivitis i conjuntivitis al·lèrgica
- Trastorns de la sang i sistema limfàtic: eosinofília

Conservació:

Conservació en nevera (entre 2 i 8 °C).

No congelar i protegir de la llum.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

A temperatura ambient (inferior a 30°C), el medicament es manté estable durant 14 dies. El medicament s'ha d'administrar dins dels 14 dies d'estabilitat i si no s'ha administrat un cop finalitzat aquest període, s'ha de rebutjar. Una vegada s'ha conservat a temperatura ambient, no es pot retornar a la nevera per recuperar la caducitat original.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

[Inyección de tralokinumab-ldrm: MedlinePlus medicinas](#)

