

## **RITLECITINIB 50 mg (Litfulo®)**

---

### ***Servei de Farmàcia***

Litfulo® conté el principi actiu Ritlecitinib, que actua reduint l'activitat dels enzims Janus quinasa (JAK) i tirosina quinasa, que intervenen en la inflamació del fol·licle pilós.

Està indicat per al tractament simptomàtic de l'alopecà areata severa en adults i adolescents majors de 12 anys. L'alopecà areata és una malaltia en la qual el propi sistema immunitari ataca als fol·licles pilosos, causant una inflamació que condueix a la caiguda dels cabells.

### ***Com s'ha de prendre?***

Litfulo® s'administra per via oral. Les càpsules (dures) s'han de prendre senceres i amb un got d'aigua. Es pot prendre amb aliments o sense. La dosi habitual és de 50 mg (una càpsula) al dia.

### ***Què fer si s'oblida una dosi?***

Prengui-la el més aviat possible, excepte si falten menys de 8 h per a la següent dosi.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

### ***Precaucions***

- No pot prendre Litfulo® durant l'embaràs i durant la lactància.
- Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament i almenys un mes després de finalitzar-lo.
- No es recomana la vacunació amb certes vacunes (xarampió, rubèola, parotiditis, varicel·la, febre groga, vacuna oral de la febre tifoidea...) immediatament abans ni durant el tractament amb Litfulo®.
- Informi al seu metge si alguna vegada ha tingut una infecció per herpes zòster o tuberculosi.

### ***Contraindicacions***

- Al·lèrgia (hipersensibilitat) al principi actiu o a algun dels excipients. Litfulo® conté lactosa.
- Infeccions greus actives, incloent-hi la tuberculosi.
- Insuficiència hepàtica greu.

### ***Interaccions amb altres medicaments***

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Litfulo®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

### ***Efectes adversos***

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Litfulo®, trobem:

- Trastorns gastrointestinals (diarrea).
- Risc augmentat de patir infeccions que es poden manifestar amb febre o calfreds, tos, pèrdua de pes i fatiga.
- Trastorns de la pell com acne, urticària o erupcions cutànies ja que pot incrementar el risc d'herpes zòster.
- Mareigs.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos.

### ***Conservació***

Mantenir els comprimits a l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

### ***Caducitat***

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs. La data de caducitat és l'últim dia del mes que s'indica.

### ***Si vol saber més pot consultar...***

<https://cima.aemps.ces/cima/DcsPub/16/3228>

