

MIRIKIZUMAB (Omvo^h®)

Servei de Farmàcia

Omvo^h® conté el principi actiu mirikizumab, un anticòs monoclonal indicat pel tractament de la colitis ulcerosa activa, de moderada a greu, en pacients adults.

És un anticòs monoclonal humanitzat que bloqueja l'acció d'una proteïna anomenada interleucina 23 (IL-23). La IL-23 juga un paper clau en l'aparició dels signes i símptomes d'inflamació propis de la colitis ulcerosa.

Com s'ha d'administrar?


Omvo^h 100 mg ploma injectable, s'ha d'utilitzar únicament per a les **dosis subcutànies de manteniment**.

La dosi recomanada de mirikizumab consta de dues parts:

- Una dosi d'inducció intravenosa que s'administra a l'hospital en les setmanes 0, 4 i 8.
- Dosis subcutànies de manteniment mitjançant Omvo^h 100 mg ploma injectable. Aquestes dosis són de **200 mg** (en dues plomes precarregades) **cada 4 setmanes** després de completar la dosi d'inducció.

S'administra per injecció subcutània (sota la pell). Es pot administrar en abdomen, cuixa o zona externa de la part posterior dels braços. Injectar-se en un lloc diferent cada vegada.

No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o cicatriu, o estigui dura.



Què fer si s'oblida una dosi?

Ha d'administrar-la l'abans possible i reprendre l'administració cada 4 setmanes.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament i durant al menys 10 setmanes després del tractament.

No es recomana el seu ús durant l'embaràs ni durant la lactància. Consultar al seu metge.

Contraindicacions

- Hipersensibilitat (al·lèrgia) al principi actiu o a algun dels excipients.
- Infeccions actives clínicament importants (p. ex. tuberculosi activa).

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents trobem:

- Risc d'infeccions del tracte respiratori superior: refredat comú.
- Mal de cap.
- Reaccions en el lloc d'injecció i erupció cutània.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments podrien interferir en l'efecte d'Omvo[®]. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Conservació

Conservar a la nevera (entre 2 i 8 °C). No congelar i protegir de la llum. Mantenir fora de l'abast dels nens.

Omvo[®] es pot conservar sense refrigerar fins a 2 setmanes a una temperatura no superior a 30°C. Si es superen aquestes condicions, s'ha de rebutjar Omvo[®].

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

[:: CIMA :: PROSPECTO OMVOH 100 MG SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA](#)

