

FOSTAMATINIB (Tavlesse® 100, 150 mg)

Servei de Farmàcia

Què és Fostamatinib?

És un antineoplàsic (inhibidor de tirosina quinasa) que redueix la destrucció de les plaquetes per anticossos en la melsa. S'utilitza en trombocitopènia immunitària crònica.

Excipients: manitol, hidrogencarbonat de sodi (23 mg/comp de 100 mg de fostamatinib) i carboximetilalmidó sòdic tipus A.



Quina dosi he de prendre?

Ha de prendre 100 mg de **fostamatinib** (1 comprimit) dues vegades al dia amb o sense aliments. Pot ser que el seu metge augmenti la dosi de fostamatinib a 150 mg dues vegades al dia després del primer mes de tractament. En cas de toxicitat es pot modificar la dosi.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

Com hauria de prendre Fostamatinib?

Haurà de prendre la dosi indicada **amb o sense aliments**, procurant que sempre sigui la mateixa hora. No mastegui, trituri o trenqui els comprimits.

Què faig si oblidó una dosi?

No prengui la dosi oblidada, i continuï el seu tractament amb la següent dosi programada.
En cas de vòmit. **NO prengui una altra dosi** i continuï el seu tractament amb normalitat.

Què ha d'explicar-li al seu metge i farmacèutic abans de començar el tractament?

- ☐ Historial d'al·lèrgia a fostamatinib o a alguns dels seus excipients.
- ☐ Historial de malaltia hepàtica, hipertensió o osteoporosi.
- ☐ Embaràs i lactància.
- ☐ Abans d'administrar vacunes per risc augmentat d'infecció.

Quins efectes adversos puc tenir?

- Molt freqüents (1 de cada 10 persones):
 - **Diarrea** i nàusees.
 - Mareig.
 - **Augment de la tensió arterial.**
 - Alteració del fetge (augment de transaminases).

- Freqüents (5 de cada 100 persones):
 - Alteració del gust i dolor abdominal.
 - Disminució de defenses.
 - Erupció a la pell.
 - Cansament.
 - Infecció de vies respiratòries i dolor de pit.
- Greus (menys d'1 de cada 1000 persones):
 - Pneumònia.
 - Crisi hipertensiva (tensió arterial 180/120).

Fostamatinib pot interaccionar amb altres medicaments?

Ha d'informar al seu metge i farmacèutic de tota la medicació i productes naturals que pren. Alguns dels medicaments que produeixen interaccions amb la combinació són:

Alguns **antibiòtics** (com ciprofloxacina, claritromicina o rifampicina), **antiepilèptics** (com carbamazepina, fenitoïna, primidona o fenobarbital), **antifúngics** (com fluconazol, itraconazol, posaconazol, ketoconazol o voriconazol), **tractament per al cor** (com verapamilo, diltiazem o dronedarona) i **antivirals utilitzats en el tractament del VIH** (com efavirenz, cobicistat, elvitegravir, lopinavir o ritonavir), **fàrmacs utilitzats per a prevenir les nàusees i els vòmits** (aprepitant o netupitant) o ciclosporina.

Es recomana vigilar si apareixen efectes secundaris quan s'utilitza fostamatinib junt amb **medicaments que redueixen el colesterol** com simvastatina o rosuvastatina, **tranquil·litzants** com el midazolam, **anticonceptius hormonals** amb etinilestradiol o **medicaments per al cor** com digoxina.

Plantes medicinals com l'herba de Sant Joan o aliments com el suc de pomelo.

Com he de conservar Fostamatinib?

- ☐ A temperatura ambient, allunyat de la humitat, la calor i la llum. Ha de conservar les càpsules a l'envàs original.
- ☐ En el cas que li sobri medicació, retorni-la al Servei de Farmàcia del seu Hospital.
- ☐ No utilitzi aquest medicament després de la data de caducitat que apareix a la caixa després de "CAD". La data de caducitat és l'últim dia del mes que s'indica.

Observacions:

- ☐ Vigilar l'INR si s'administren **fàrmacs anticoagulants** com acenocumarol (Sintrom®).
- ☐ Haurà de mesurar-se la **tensió arterial** a casa regularment sobretot al principi del tractament amb fostamatinib. Fer-ho sempre a la mateixa hora i quan estigui tranquil. Apunti-la en un paper per a ensenyar-li al seu metge.