

ABACAVIR 300 mg comprimits, (ZIAGEN ®)

Abacavir és un inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg dels nucleòsids (ITIAN). Abacavir actua bloquejant l'activitat de la transcriptasa, un enzim produït per el VIH que li permet infectar les cèl·lules de l'organisme i produir més virus.

Abacavir al bloquejar aquest enzim i administrat en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, redueix la quantitat de VIH en sang i la manté a nivells baixos. Abacavir no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però si pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició de infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Els comprimits s'han de prendre sencers i amb un got d'aigua.

Es podem prendre amb o sense aliments. Si té problemes gastrointestinals pot prendre'l amb aliments.

Què fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la lo abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que la oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

- Reacció d'hipersensibilitat a Ziagen®:

Aquest medicament pot provocar una reacció de hipersensibilitat o reacció al·lèrgica greu per la seva salut. Quan apareix, acostuma a fer-ho en les primeres sis setmanes de tractament i empitjora al continuar-lo. Si es detecta a temps la seva aparició no cal amoïnar-se. Consulti al seu metge IMMEDIATAMENT si nota qualsevol dels següents símptomes: febre, erupció cutània, envermelliment i/o picors, nàusees, vòmits, diarrea o dolor abdominal, cansament, malestar general, dificultat per respirar, mal de coll o tos.

El seu metge valorarà si aquest símptomes es deuen a la reacció de hipersensibilitat o a altres causes i si cal suspendre o no el tractament amb Abacavir. Si el seu metge suspèn el tractament amb Abacavir, **MAI MÉS** el podrà tornar a prendre.

Cal prendre Abacavir de forma regular per evitar el risc de reaccions de hipersensibilitat. L'envàs del medicament conté una targeta informativa sobre aquesta reacció que sempre ha portar a sobre.

Si per qualsevol motiu ha deixat de prendre Abacavir es important que es posi en contacte amb el seu metge abans de reiniciar el tractament.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament. Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Evitar l'alletament durant el tractament.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte de Abacavir. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes adversos

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Abacavir trobem:

Trastorns del son, mal de cap, trastorns gastrointestinals (nàusees, vòmits, diarrea) i pèrdua de la gana.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

