


ABAPTACEPT (ORENCIA ®)

Abatacept és un agent biològic que actua reduint el dolor i la inflamació associat a malalties autoimmunes com l'artritis reumatoide.

Com s'ha de prendre?

Orencia® s'administra en combinació amb metotrexat.

A l'iniciar el tractament la primera dosi s'administra per via intravenosa . La dosi depèn del pes del pacient. Al dia següent s'administrarà una dosi subcutània (sota la pell) i posteriorment una dosi subcutània setmanal. No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura. Si ja ha esta prenen Orencia® intravenós i vol canviar a la via subcutània, s'ha d'administrar una injecció subcutània en lloc de la següent perfusió intravenosa, seguida per una injecció subcutània setmanal.



Orencia® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, de 30 a 60 minuts abans d'administrar.

Què fer si s'oblida una dosi?

Administri-la lo abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que la oblidada.

La dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins 14 setmanes després de finalitzar-lo.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Evitar l'alletament durant el tractament i fins a 14 setmanes després de finalitzat.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Orencia®. Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte de Orencia®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

Orencia® 125 mg xp

Orencia 250 mg vial

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Orenzia® trobem:

risc augmentat de patir infeccions especialment de les vies aèries superiors. Aquestes infeccions es poden manifestar amb febre, ferides, malestar general, problemes dentals, tos, molèsties a l'orinar.

També pot produir: inflamació, dolor, envermelliment, pruija en el lloc d'injecció; reacció al·lèrgica (erupció cutània, dificultat per respirar, inflamació de la cara, mans o peus); debilitat en braços o cames; inflamació dels ulls; formigueig; dolor en el pit; peus i turmells unflats; mal de cap; nàusees i diarrea.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos:

- Erupció greu, urticària o altres símptomes de reacció al·lèrgica
- Cara, mans o peus unflats
- Dificultat per respirar o empassar
- Febre, tos persistent, pèrdua de pes o cansament

Conservació

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C).

Si per accident la medicació queda fora de la nevera o es congela no la llenci i consulti al servei de farmàcia de l'hospital.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

