

BICTEGRAVIR/ EMTRICITABINA/ TENOFOVIR ALAFENAMIDA (BIKTARVY®)

És la combinació de tres fàrmacs: Bictegravir , Emtricitabina i Tenofovir alafenamida.

Emtricitabina i Tenofovir alafenamida són inhibidors de la transcriptasa inversa anàleg dels nucleòsids (ITIAN). Actuen bloquejant l'activitat de la transcriptasa, un enzim produït per el VIH que li permet infectar les cèl·lules de l'organisme i produir més virus.

Bictegravir és un inhibidors de la integrasa. Bloqueja un enzim anomenat integrasa, implicat en una fase de la reproducció del VIH. Quan aquest enzim es bloqueja el virus no es reproduceix normalment, frenant així la propagació de la infecció.

Biktarvy® redueix la quantitat de VIH en la sang a nivells baixos . No cura la **infecció per el VIH ni el SIDA , però si** pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició de infeccions i malalties associades al SIDA.

Com s'ha de prendre?

S'administra Biktarvy ® 1 comprimit al dia amb un got d'aigua i amb o sense aliments.
Els comprimits es prenen sencers, no es recomana mastegar, triturar o partir els comprimits.

Que fer si s'oblida de prendre una dosi?

L'ha de prendre lo abans possible sempre i quan la següent dosi no sigui abans de 6 hores. Si la següent presa és abans de 6 h, no prengui la dosi oblidada i seguir amb la pauta de dosificació habitual. No dobli mai la dosi.

En cas de qualsevol dubte preguntí al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Biktarvy®. No prengui cap medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.

Si es queda embarassada durant el tractament avisar immediatament al seu metge. Evitar la lactància materna durant el tractament.

Advertències

Actualment s'ha aprovat que una supressió viral eficaç amb un tractament antirretroviral redueix substancialment el risc de transmissió sexual, però no es pot excloure el risc residual. Consulti al seu metge sobre les precaucions per prevenir la transmissió.

Contraindicacions

Pacients amb hipersensibilitat a Bictegravir, Emtricitabina o Tenofovir alafenamida.
No prendre si està en tractament amb Rifampicina. No prendre Herba de Sant Joan.

Efectes secundaris

Els més freqüents són:

- Mal de cap
- Diarrea
- Nàusees
- Mareig
- Insomni
- Cansament

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquests o altres efectes.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat
Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

Forma farmacèutica: COMPRIMIDOS
Descripción

Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripciones	Presencia de dibujo
	MARRON ROJIZO	NO	15,00mm	GSI 9883	NO

