

DANUVIR 800 mg /COBICISTAT 150 mg/EMTRICITABINA 200 mg/TENOFOVIR ALAFENAMIDA 10 mg (Symtuza®)

Conté 4 principis actius:

Darunavir és un inhibidor de la proteasa.

El **cobicistat** potencia els efectes del darunavir al prolongar el seu temps d'acció en l'organisme.

Emtricitabina i Tenofovir alafenamida que són medicaments inhibidors de la transcriptasa inversa

Al bloquejar aquests enzims el virus no es reproduïx de forma normal i es frena la propagació de la infecció. A l'administrar Symtuza®, es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Symtuza® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però sí pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició de infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

La dosi recomanada en adults **és 1 comprimit un cop al dia amb aliments** (estómac ple). El comprimit s'han de prendre sencer amb aigua, llet o beguda nutricional.

Prengui Symtuza® al voltant de la mateixa hora tots els dies.

Que fer si s'oblida una dosi?

Si es dona compte en menys de 12 hores després de l'hora a la que normalment el pren, prengui el comprimit immediatament amb algun aliment. Després continuï amb la següent dosi a l'hora habitual.

Si es dona compte a les 12 hores o més després de l'hora a la que el pren normalment Symtuza®, no prengui la dosi oblidada y prengui després la dosi següent a l'hora habitual.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Symtuza® esta contraindicat en pacients amb insuficiència hepàtica greu.

No prengui Symtuza® si és al·lèrgic a algun dels seus components.

Utilitzar Symtuza® amb precaució en pacients amb al·lèrgia a les sulfamides.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu **no hormonal** eficaç durant el tractament. Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Evitar l'alletament durant el tractament, a més el nen pot infectar-se amb l'VIH a través de la llet materna.

Interaccions amb altres medicaments

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

No combini Symtuza® amb: Alfuzosina, amiodarona, dronedarona, quinidina, ranolazina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoïna, colchicina si té problemes de fetge o ronyó, rifampicina, pimozina, quetiapina, lurasidona, alcaloides ergotamínics com ergotamina, dihidroergotamina, ergometrina i metilergonovina, Hipèric o herba de Sant Joan, lovastatina, simastatins i lomitapida, triazolam o midazolam oral, sildenafil, avanafil, ticagrelor.

Altres medicaments poden afectar/ ser afectats per Symtuza. CONSULTI-HO.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Symtuza® trobem:

mal de cap, trastorns gastrointestinals

(vòmits, diarrea), reacció de hipersensibilitat, anorèxia, augment dels nivells de colesterol, triglicèrids i glucosa en sang i possible augment de sagnat en pacients hemofílics.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos. Inclòs si es tracta d'algun no descrit en el prospecte.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original **ben tancat**, a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

