

DOLUTEGRAVIR (TIVICAY®)

Es un medicament que conte dolutegravir, indicat per el tractament de la infecció per VIH.

Dolutegravir es un inhibidor de la integrasa. Bloqueja un enzim anomenat integrasa, implicat en una fase de la reproducció del VIH. Quan aquest enzim es bloqueja el virus no es reproduïx normalment, frenant així la propagació de la infecció.

Tivay® en combinació amb altres medicaments antiretrovirals manté la quantitat de VIH en la sang a nivells baixos. No cura la infecció per el VIH ni el SIDA, però sí pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició de infeccions i malalties associades al SIDA.

Posologia

Tivay® s'administra un comprimit de 50 mg al dia; si està prenent altres medicaments (efavirenz, nevirapina, tipranavir/ritonavir o rifampicina) o presenta resistència al inhibidor de la integrasa la dosi es de 1 comprimit dos cops al dia.

Els comprimits es prenen sencers, no es recomana mastegar, triturar o partir els comprimits.

Administrar amb un got d'aigua. Es poden prendre amb o sense aliments.

En el cas de presentar resistència als inhibidors de la integrasa cal administrar amb aliments.

Que fer si s'oblida de prendre una dosi?

L'ha de prendre lo abans possible sempre i quan la següent dosi no sigui abans de 4 hores. Si la següent toma es abans de 4 h, no prendre la dosi oblidada i seguir amb la pauta de dosificació habitual. No dobli mai la dosi.

En cas de qualsevol dubte preguntí al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Tivay®. No prengui cap medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.

Si es queda embarassada durant el tractament ha de avisar immediatament al seu metge. Evitar la lactància materna durant el tractament.

Dolutegravir pot provocar mareig, si es troba marejat eviti activitats perilloses com conduir o utilitzar màquines.

Contraindicacions

Pacients amb hipersensibilitat a Dolutegravir.

No prendre si està en tractament amb Dofetilina.

Efectes secundaris

Els més freqüents son:

- Diarrea
- Nàusees
- Mal de cap

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquest o altres efectes.

Presentacions

Tivicay® 50 mg comprimits

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

