

DOLUTEGRAVIR/ LAMIVUDINA (DOVATO®)

Es la combinació de dos fàrmacs: Lamivudina (300 mg) i Dolutegravir (50 mg).

Lamivudina es un inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg dels nucleòsids (ITIAN). Actua bloquejant l'activitat de la transcriptasa, un enzim produït per el VIH que li permet infectar les cèl·lules de l'organisme i produir més virus.

Dolutegravir es un inhibidor de la integrasa. Bloqueja un enzim anomenat integrasa, implicat en una fase de la reproducció del VIH. Quan aquest enzim es bloqueja el virus no es reproduceix normalment, frenant així la propagació de la infecció.

Dovato® manté la quantitat de VIH en la sang a nivells baixos . No cura la infecció per el VIH ni el SIDA, però si pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició de infeccions i malalties associades al SIDA.

Posologia

Dovato® s'administra per adults o adolescents amb un pes superior a 40 kg un comprimit per via oral al dia. Els comprimits es prenen sencers, no es recomana mastegar, triturar o partir els comprimits.

Administrar amb un got d'aigua. Es poden prendre amb o sense aliments.

Que fer si s'oblida de prendre una dosi?

L'ha de prendre lo abans possible sempre i quan la següent dosi no sigui abans de 4 hores. Si la següent toma es abans de 4 h, no prendre la dosi oblidada i seguir amb la pauta de dosificació habitual. No dobli mai la dosi.

En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Dovato®. No prengui cap medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.

Dolutegravir pot provocar una reacció de hipersensibilitat.

El seu metge valorarà si aquest símptomes es deuen a la reacció de hipersensibilitat o a altres causes i si cal suspendre o no el tractament amb Dolutegravir. Si el seu metge suspèn el tractament amb Dolutegravir **MAI MÉS** el podrà tornar a prendre.

Si es queda embarassada durant el tractament avisar immediatament al seu metge. Evitar la lactància materna durant el tractament.

Dolutegravir pot provocar mareig, si es troba marejat eviti activitats perilloses com conduir o utilitzar màquines.

Contraindicacions

Pacients amb hipersensibilitat a Lamivudina o Dolutegravir.

No prendre si està en tractament amb Dofetilina.

Dovato® no està recomanat en pacients amb un aclariment de creatinina <50 ml/min ni en pacients amb insuficiència hepàtica greu.

Efectes secundaris

Els més freqüents son:

- Hipersensibilitat
- Insomni, alteració del son
- Diarrea, nàusees
- Cansament
- Mal de cap

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquest o altres efectes.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

