

ELVITEGRAVIR/ COBICISTAT/ EMTRICITABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL (STRIBILD®)

Es un medicament que conté els principis actius: Elvitegravir 150 mg, Cobicistat 150 mg, Emtricitabina 200 mg i Tenofovir disoproxil 245 mg indicats per el tractament de la infecció per VIH.

Elvitegravir actua inhibint l'enzim integrasa que participa en el procés de replicació del virus, d'aquesta manera redueixen la capacitat del virus de replicar-se amb normalitat. El cobicistat potencia els efectes del elvitegravir al prolongar el seu temps d'acció en l'organisme.

El disopropil de tenofovir és un profàrmac del tenofovir, es a dir que es converteix en el principi actiu tenofovir en l'organisme.

Emtricitabina i Tenofovir son inhibidors de la transcriptasa inversa anàleg dels nucleòsids . Els dos principis actius bloquegen l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït per el VIH que li permet infectar a les cèl·lules i fabricar més virus.

Stribild® manté la quantitat de VIH en la sang a nivells baixos . No cura la infecció per el VIH ni el SIDA , però si pot frenar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició de infeccions i malalties associades al SIDA.

Posologia

Stribild® s'administra un comprimit un cop al dia.

Els comprimits es prenen sencers amb un got d'aigua i després d'un àpat (amb l'estomac ple).

Que fer si s'oblida de prendre una dosis?

L'ha de prendre lo abans possible. Si han passat més de divuit hores esperi a la següent toma i no dobli mai la dosis.

Si vomita en el plaç d'una hora després de prendre Stribild® , ha de prendre un altre comprimit.

En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Stribild® ®. No prengui cap medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.

Cal calcular abans de iniciar el tractament l'aclariment de creatinina i determinar els nivells de glucosa i proteïnes em la orina dels pacients. Es recomana iniciar el tractament en pacients amb ClCr>90 ml/min.

Stribild® conté lactosa com excipient.

L'ús de Stribild® s'ha d'acompanyar de mètodes anticonceptius efectius.

Stribild® únicament s'ha de utilitzar durant l'embaràs si el benefici potencial justifica el risc potencial.

No utilitzar durant l'alletament.

Pot provocar mareig, cal anar amb precaució al conduir i utilitzar màquines.

Contraindicacions

Pacientes amb:

- ClCr < 70 ml/min
- Hipersensibilitat a elvitegravir, cobicistat, emtricitabina i /o tenofovir

Efectes secundaris

Els més freqüents son:

- Astènia, erupcions cutànies
- Disminució de la quantitat de fosfat en sang
- Mal de cap i mareig
- Diarrea, vòmits, nàusees

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquest o altres efectes secundaris.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegits de la llum i la humitat
Mantenir fora de l'abast dels nens

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>
<http://www.gtt-vih.org/>



Forma farmacèutica: DESCRIPCIÓN		COMPRIMIDOS				
Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripciones	Presencia de dibujo	
	VERDE	NO	10,00mm	GSI 1	NO	