

ERENUMAB (AIMOVIG®)

Erenumab és un medicament antimigranyós, un anticòs monoclonal humà que s'uneix al receptor del pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina (CGRP). Aquest receptor es troba localitzat en llocs rellevants en la fisiopatologia de la migranya, com en el gangli del trigènim.

El CGRP és un neuropèptid que modula les senyals nociceptives i un vasodilatador que s'ha associat a la fisiopatologia de la migranya. S'han observat que els seus nivells augmenten durant la migranya i disminueixen quan s'alivia. L'erenumab competeix de forma específica per la unió al receptor amb el CGRP i, per tant, inhibeix els seus efectes.

Està indicat com a profilaxis de la migranya en adults amb almenys 4 dies de migranya al mes. Està finançat pel sistema públic en pacients amb almenys 8 dies de migranya/mes (migranya episòdica de freqüència alta i migranya crònica) i que hagin fracassat a almenys 3 tractaments previs.


Com s'ha d'administrar?

Erenumab s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

La injecció es pot administrar en l'abdomen, cuixa o en la zona externa de la part superior dels braços.

Si el metge li prescriu la dosi de 70 mg s'ha de posar la injecció un cop cada 4 setmanes. En canvi, si la dosi és de 140 mg s'ha de posar una injecció de 140 mg o dos injeccions consecutives de 70 mg, un cop cada 4 setmanes.

Per evitar qualsevol molèstia en lloc de la punció, s'ha de mantenir la ploma precarregada a temperatura ambient durant almenys 30 minuts abans de la injecció.



Què fer si s'oblida una dosi?

Ha d'administrar-la lo abans possible i contactar amb el metge que li donarà una nova pauta d'administració.

Precaucions

Evitar el seu ús durant l'embaràs. Consultar amb el metge sobre la utilització de erenumab durant l'alletament. No s'ha avaluat la seva eficàcia i seguretat en pacients amb certes malalties cardiovasculars.

Interaccions amb altres medicaments

No s'ha observat cap interacció significativa. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Presentacions comercials

Presentacions al nostre centre:

- Aimovig® 70 mg pluma precarregada
- Aimovig® 140 mg pluma precarregada

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents trobem:

- Trastorns del sistema immunològic: reaccions d'hipersensibilitat, erupcions exantemàtiques, inflamació, edema cutània i urticària.
- Trastorns gastrointestinals: restrenyiment, còlics
- Trastorns de la pell i del teixit subcutani: pruït
- Trastorns musculoesquelètic i del teixit conjuntiu: espasme muscular
- Trastorns generals i alteracions en el lloc d'administració: dolor en el punt d'injecció.

Conservació

Conservació en nevera (entre 2 i 8 °C).

Si per accident la medicació queda fora de la nevera, la medicació és estable 14 dies a temperatura ambient (tirar passats els 14 dies).

No congelar i protegir de la llum.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a618029-es.html>

