

ESTAVUDINA (ZERIT®)

Conté el principi actiu Estavudina.

Estavudina és un inhibidor de la transcriptasa inversa anàleg de nucleòsid (ITIAN), es a dir bloqueja l'activitat d'un enzim anomenat transcriptasa inversa produïda per el VIH que li permet infectar les cèl·lules de l'organisme i produir més virus.

A l' administrar Zerit® en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Zerit® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però si pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició de infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

Les càpsules s'han de prendre senceres i amb l'estómac buit, una hora abans o dues hores després dels àpats. Si no es possible empassar les càpsules es poden obrir i barrejar el seu contingut amb algun aliment.

Que fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la lo abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que la oblidada. No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament.
Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Evitar l'alletament durant el tractament.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

Zerit® 30 mg càpsules

Zerit® 40 mg càpsules

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte de Zerit®.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Zerit[®] trobem:

Neuropatia perifèrica (formigueig, rigidesa i dolor en mans i peus), diarrea, nàusees, dolor abdominal, dispèpsia, cansament, lipodistròfia, mareig, insomni, pensaments estranys, somnolència, depressió, erupció cutània, picors.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest símptomes.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat
Mantenir fora de l'abast dels nens

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

Forma farmacèutica: CAPSULAS

Descripción

Color 1	Color 2	Inscripciones	Presencia de dibujo
NARANJA CLARO	NARANJA OSCURO	BMS 1966 30	NO