

ETANERCEPT (BENEPALI®)


Benepali® conté el principi actiu Etanercept.

Etanercept és un agent biològic que actua reduint el dolor i la inflamació associat a certes malalties autoimmunes com artritis reumatoide, espondilitis anquilosant, artritis psoriàsica o psoriasis.

Com s'ha de prendre?

Benepali® s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

Benepali® 50mg s'administra un cop setmana, segons com li hagi prescrit el seu metge. Triï un dia fixe i administri sempre Benepali® el mateix dia i a la mateixa hora.



Benepali® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar.

Que fer si s'oblida una dosi?

Administri-la lo abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que la oblidada.

La dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Evitar l'alletament durant el tractament.

El tap de l'agulla de la ploma conté làtex, no el manipuli si té al·lèrgia al làtex.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Benepali®

Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Si té una infecció activa com la grip, úlcera en una cama... no ha de començar el tractament amb Benepali®

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

Benepali® 50 mg ploma



Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte de Benepali® No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Important:

- Anakinra contraindicat
- Vacunes virus vius atenuats precaució
- Ulfasalazina: reducció glòbuls blancs

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associat a Benepali® trobem:

risc augmentat de patir infeccions (que es poden manifestar amb febre, ferides, malestar general, problemes dentals, tos, molèsties a l'orinar); inflamació, dolor, envermelliment, pruija en el lloc d'injecció; reacció al·lèrgica (erupció cutània, dificultat per respirar, inflamació de la cara, mans o peus); debilitat en braços o cames;; visió doble; formigueig; dolor en el pit; peus i turmells unflats; mal de cap; nàusees i diarrea.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos.

Conservació

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C).

Si per accident la medicació queda fora de la nevera o es congela no la llenci i consulti al servei de farmàcia de l'hospital.

Mantenir fora de l'abast dels nens

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>