Consorci Sanitari
Alt Penedès-Garraf

Informació

EVOLOCUMAB (REPATHA®)

Repatha ® conté el principi actiu Evolocumab.

Evolocumab és un agent biològic que actua reduint els nivells de colesterol "dolent", un tipus de greix que es troba a la sang. Sempre ha d'anar amb la dieta recomanada per el seu metge.

Com s'ha de prendre?



Repatha ® s'administra per via subcutània (sota la pell) en l'abdomen, la cuixa i la part superior del braç. No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

La dosi recomanada de Repatha ® es de 140 mg cada dues setmanes o 420 mg un cop al mes. El seu metge li indicarà quina es la seva pauta.

Trií un dia de la setmana i administri Repatha ® el mateix dia a la mateixa hora una setmana si i una setmana no o en el cas de un cop al mes administri les tres plomes de forma consecutiva en un interval de 30 minuts.

Repatha ® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar.

Que fer si s'oblida una dosi?

Administri-la lo abans possible.

La dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Utilitzar amb precaució en pacients amb insuficiència renal greu i/o insuficiència hepàtica greu. Fer seguiment en pacients amb insuficiència hepàtica moderada.
No es recomana utilitzar Repatha ® durant l'embaraç i es desconeix si s'excreta per la llet materna.

Es desconeix si Repatha ® pot influir en la capacitat de conduir i utilizar màquines.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:
Repatha ® 140 mg ploma.

La solució es entre transparent i opalescent, entre incolora i groguenca i està pràcticament lliure de partícules.

La caputxa de l'agulla de la ploma precarregada està fabricada amb cautxú natural (un derivat del làtex)

Interaccions amb altres medicaments

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Repatha ® trobem:

- Risc augmentat de patir infeccions com la grip, nasofaringitis, infeccions del tracte respiratori superior
- Inflamació, dolor, envermelliment, pruïja en el lloc d'injecció
- Erupció cutània
- Nàusees
- Mal d'esquena, artràlgia

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos.

Conservació

Conservi en nevera (entre 2 i 8ºC). No congelar.

Un cop fora del frigorífic Repatha® es pot conservar a Tª ambient (fins 25ºC) en l'envàs original i utilitzar abans de un mes.

Protegir de la llum.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs

Si vol saber més pot consultar...

https://medlineplus.gov/spanish/druginformation. html