

ACETAT DE GLATIRAMER (COPAXONE®)

Copaxone® conté el principi actiu acetat de glatiramer. L'acetat de glatiramer es l'acetat de polipeptids sintètics que contenen quatre aminoàcids obtinguts de forma natural. Es pensa que actua modificant els processos immunes que en la actualitat es creu que son els responsables de la patogènesis de la EM.

S'utilitza per tractar l'Esclerosi Múltiple primera brotada i recidivant i remitent .

L'Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica que afecta al sistema nerviós central. En la Esclerosi Múltiple el sistema immunitari (les defenses de l'organisme) destrueix la coberta protectora (mielina) que recobreix els nervis del sistema nerviós central, aquest fet pot retardar o interrompre la transmissió de les senyals que passen a través de les cèl·lules nervioses i donar lloc als símptomes de l'Esclerosi Múltiple.

L'Esclerosi Múltiple es caracteritza per atacs repetitius de símptomes del sistema nerviós que son un reflex de la inflamació que té lloc en el sistema nerviós central. A aquests atacs se'ls anomena brots.


Els símptomes dels brots varien de un pacient a un altre, però generalment consisteixen en: dificultat per caminar, pèrdua de sensibilitat o formigueig, problemes de visió i trastorns en l'equilibri.

Copaxone® esta indicat com a tractament modificador del curs de la malaltia. No cura la malaltia.

Com s'ha de prendre?

Copaxone® s'administra per via subcutània un cop al dia, a la mateixa hora (es recomana a l'hora d'anar a dormir).

No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura. Canviï de lloc d'administració cada cop.



Avonex® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar.

Que fer si s'oblida una dosi?

No la prengui. La dosi següent s'administrarà al dia següent.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

No administrar si té al·lèrgia a acetat de glatiramer o al manitol.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

Copaxone® 20 mg/ml xeringa.

Copaxone® 40 mg/ml xeringa

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte de Copaxone®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Reaccions freqüents en el lloc de la injecció com eritema, dolor, tumefacció, pruriti, edema, inflamació e hipersensibilitat.

Depressió, mal de cap, febre, escalfrets, sudoració, dolors musculars (especialment al començament del tractament)

Reacció immediata post-injecció: vasodilatació, dolor toràcic, disnea, palpitations o taquicardia.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos.

Conservació

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C). No congelar. Conservar protegit de la llum (dins del seu envàs) fins el moment de l'administració.

Pot estar fora de la nevera (entre 25-30°C) màxim de 1 mes.

Mantenir fora de l'abast dels nens

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

